

NOTICIARIO ORNITOLÓGICO

Recopilado por Blas MOLINA y Juan Antonio LORENZO (Canarias)

De acuerdo con los recientes cambios adoptados por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife, que aparecen en su informe en este mismo volumen y como ya se había indicado anteriormente (véase Molina *et al.* 2006), a partir del 1 de enero de 2006 han dejado de tratarse como rarezas y, por tanto, se incluyen aquí las citas de *Larus delawarensis* y *Anthus richardi*. Por el contrario, desde esa misma fecha comienzan a tratarse como rarezas las siguientes especies: *Anser fabalis*, *Anser albifrons flavirostris*, *Turnix sylvaticus*, *Crex crex*, *Phalaropus lobatus*, *Sterna bengalensis*, *Luscinia svecica svecica*, *Sylvia balearica*, *Sylvia curruca* y *Lanius excubitor*. Otros detalles al respecto pueden consultarse en www.seo.org/rarezas.cfm.

Ánsar careto

Anser albifrons

Dos aves adultas de la subespecie *albifrons* en los arrozales de Cantarita, Isla Mayor, Sevilla, el 25 de octubre de 2007 (F. Chiclana). Cuatro aves en campos de cultivo de Boada de Campos, Palencia, el día 18 de noviembre de 2007 (G. Para y F. Chiclana).

Ánsar común

Anser anser

Al menos tres parejas crían en una isla del embalse de Huéznar, El Pedroso, Sierra Norte de Sevilla, en la primavera de 2007. Son de origen desconocido, aunque por las observaciones hechas podrían ser aves de origen silvestre. Se lleva detectando su reproducción desde 2001 atraídos por gansos domésticos. Se ha registrado su reproducción en los últimos cinco años, sin presencia aparente de individuos domésticos. Sólo se han podido registrar puestas y en ningún caso la presencia de pollos (M. C. Pérez).

Barnacla cariblanca

Branta leucopsis

Observación de 14 ejemplares en el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Noja y Joyel, Cantabria, durante el mes de enero de 2007 (V. Iturriaga). Un individuo junto

con un grupo de gansos en la laguna de Louro, A Coruña, el 3 de abril de 2007 (C. Sunyer). Tres aves en campos de cultivo de Boada de Campos, Palencia, el 18 de noviembre de 2007 (G. Para y F. Chiclana).

Tarro canelo

Tadorna ferruginea

Dos aves de origen desconocido en el Paseo de las Delicias, Madrid, que se posan en el tejado y terraza de una casa, el 25 de abril de 2007 (C. Smith). Dos ejemplares en un charcón en Puebla del Río, Sevilla, el 29 de abril de 2007 (A. Domínguez Polvillo).

Canarias. En Lanzarote, segunda cita: tres aves en la presa de Mala, Haría, el 5 de abril de 2007 (F. J. García Vargas y J. Sagardía).

Tarro blanco

Tadorna tadorna

Se localiza una pareja con siete pollos en el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Noja y Joyel, Cantabria, el 22 de mayo de 2007; corresponde a la segunda vez que se registra su cría en este humedal (V. Iturriaga y J. Aja).

Silbón europeo

Anas penelope

Canarias. En Tenerife, observación algo tardía: macho en la charca de El Fraile, Aro-

na, el 26 de mayo de 2007 (N. Herrera y B. González).

Ánade rabudo

Anas acuta

Canarias. En La Palma, donde se conocen pocos datos, en charca de riego en Las Martelas, Los Llanos de Aridane, un macho el 5 de enero de 2006 (C. Kasche).

Porrón pardo

Aythya nyroca

Un ave en el Paraje Natural de la Desembocadura del Guadalhorce, Málaga, el 4 de septiembre de 2006 (A. Tamayo). Un macho integrado en un grupo de porrones comunes en los Charcones de Miguel Esteban, Toledo, el 24 de mayo de 2007 (D. Díaz Díaz, J. Baonza y O. Martín Díaz).

Porrón bastardo

Aythya marila

Observaciones en León en 2007: una hembra en la balsa Fontecha, Fontecha del Páramo, el 8 de mayo, y posiblemente el mismo ejemplar en la balsa Zuares, Zuares del Páramo, el 22 de abril, posteriormente el 18 de noviembre de nuevo una hembra en la balsa de Fontecha (D. Miguélez).

Malvasía cabeciblanca

Oxyura leucocephala

Dos machos adultos en el Saladar de los Canos, Vera, Almería, donde no se había observado hasta el momento, el 28 de abril y el 20 de mayo de 2007 (J. P. Enciso y M. Paracuellos/Plan Andaluz de Aves Acuáticas).

Urogallo común

Tetrao urogallus

Se detecta un ejemplar con un comportamiento poco habitual en el P. N. de Redes, Bezanes, Asturias, desde finales de 2006 hasta principios de noviembre de 2007: se trata de un macho joven, que pasea por el pueblo mostrando un comportamiento confiado y alimen-

tándose de manzanas, flores y hortalizas (F. González y otros).

Colimbo grande

Gavia immer

Un adulto y un joven en el embalse de San Andrés, Gijón, Asturias, el 3 de diciembre de 2006 (M. Quintana y C. O. Ania). Un adulto en la playa de San Lorenzo, Gijón, Asturias, el 16 de diciembre de 2006 (M. Quintana y M. F. Pajuelo). Un ejemplar inmaduro frente al Paraje Natural Desembocadura del Guadalhorce, Málaga, el 18 de febrero de 2007 (A. M. Pérez Ortigosa, P. Macaulay y A. Fortes) y el mismo día se observa también un ejemplar inmaduro frente a la punta de Calaburra, Mijas, Málaga (F. Ríos, S. Solís Gómez y T. Todorov).

Somormujo cuelliroyo

Podiceps grisegena

Un ave con plumaje invernal en el embalse de Villameca, León, el 13 de enero de 2007 (J. Falagán y P. Arroyo).

Zampullín cuellinegro

Podiceps nigricollis

Canarias. En La Palma, en charca de riego en Las Martelas, Los Llanos de Aridane, ejemplar presente los días 23, 25, 28 y 29 de octubre de 2006 (J. A. Lorenzo y I. Brito) y aún allí el 5 de enero de 2006 (C. Kasche).

Fulmar boreal

Fulmarus glacialis

Un ejemplar vuela sobre la isla Conejera, Suances, Cantabria, el 23 de abril de 2007 (F. González Sánchez). Un ave sobrevolando un acantilado, que posteriormente toma dirección oeste, en la Punta de la Vaca, Gozón, Asturias, el 2 de junio de 2007 (M. Quintana, J. Vallenga, J. Magaz y M. Louzao).

Pardela sombría

Puffinus griseus

Un ejemplar avistado desde Punta Calaburra, Mijas, Málaga, el 21 de diciembre de 2006,

volando hacia el este con pardelas baleares y, al menos, dos pardelas cenicientas (F. Ríos, B. López, A. Ternero y M. Moreno Araújo). Dos ejemplares en vuelo en dirección este a oeste observadas desde el Paraje Natural de la Desembocadura del Guadalhorce, Málaga, el 24 de julio de 2007 (A. M. Pérez).

Paño Europeo

Hydrobates pelagicus

En la ría de Avilés, Asturias, en 2007: cinco o seis ejemplares en el interior de la ría y más de 10 en la bocana, observándose alrededor de 50 llegar con un barco pesquero, el 30 de mayo (M. Quintana, M. F. Pajuelo y P. Fernández) y unos 200 en el interior de la ría, y numerosos en el mar, el 1 de junio (M. Quintana, D. Álvarez y J. Valella).

Paño boreal

Oceanodroma leucorhoa

Observación cerca de la costa: un ejemplar en dirección oeste en Punta de la Vaca, Gozón, Asturias, el 10 de diciembre de 2006 (M. Becerra).

Alcatraz atlántico

Morus bassanus

Un individuo atropellado en la autovía Santander-Torrelavega, Cantabria, el 21 de marzo de 2007 (F. González Sánchez).

Avetoro común

Botaurus stellaris

Cuatro ejemplares en vuelo en la desembocadura del río Gudalmanza, Estepona, Málaga 15 de marzo de 2006 (S. Solís). Un individuo en las Marismas Blancas, Astillero, Cantabria, el 16 de diciembre de 2006 (F. González Sánchez).

Martinete común

Nycticorax nycticorax

Primera cita de cría en Ceuta: se observan uno y dos aves durante el mes de marzo y, posteriormente, pollos voladeros en el arroyo del Infierno, el 30 de junio de 2007 (J. Sánchez Espinosa y J. M. Cárceles).

Garcilla cangrejera

Ardeola ralloides

Un ave en la laguna de la Janda, Cádiz, el 3 de diciembre de 2006 (M. Jiménez Cintado). Un ejemplar en la laguna de Victoria, Parque Natural de las Marismas de Santoña, Noja y Joyel, Cantabria, el 31 de mayo, el 8 y 21 de junio de 2007 (V. Iturriaga).

Garcilla bueyera

Bubulcus ibis

Primeros ejemplares constatados que invernan en Álava: 14 ejemplares en Izoria, Ayala, desde principios de diciembre de 2006 hasta principios de febrero de 2007 (G. Belamendia y M. Corral). Se localizan 38 nidos en la isla de San Pedruco, Noja, Cantabria, durante el mes de junio (V. Iturriaga y J. Aja). Alrededor de 1.600 ejemplares en un dormitorio en las marismas de Alday, Santander, Cantabria, el 26 de febrero de 2007 (R. González García). Recuento de 4.250 aves que entran a un dormitorio localizado en torno al río Jarama en Velilla de San Antonio, Madrid, el 7 de octubre de 2007 (B. Molina).

Garceta común

Egretta garzetta

Se cuentan 22 nidos en la isla de San Pedruco, Noja, Cantabria, durante el mes de junio de 2007 (V. Iturriaga y J. Aja).

Garza real

Ardea cinerea

Continúan apareciendo nuevas colonias en Álava, donde año tras año se registra su expansión: en la primavera de 2007 se identifica una nueva colonia en el embalse de Ullíbarri, en la isla de Orenin, con tres nidos (G. Belamendia) y en Luyando, Ayala, en una repoblación de *Pinus insignis*, otra colonia con 14 nidos (G. Belamendia, M. Corral y E. Arberas).

Garza imperial

Ardea purpurea

Se localizan cuatro nidos en las Marismas de Victoria, Parque Natural de las Marismas

de Santoña, Noja y Joyel, Cantabria, durante el mes de junio de 2007 (V. Iturriaga y J. Aja).

Cigüena negra

Ciconia nigra

Un ave en vuelo en Villamoratiel de las Matas, León, el 11 de julio de 2007 (P. Olea y D. Gómez).

Cigüena blanca

Ciconia ciconia

Concentración de alrededor de 6.000 aves tras la cosecha en los arrozales de Millán, Isla Menor, Puebla del Río, Sevilla, el 11 de octubre de 2007 (R. Martín-Baylo y F. Chiclana).

Canarias. Irrupción de efectivos en el paso primaveral de 2007. En Lanzarote, una en vuelo sobre Puerto del Carmen el 27 de marzo, y dos en Arrecife y una en el vertedero de Zonzamas el 31 de marzo de 2007 (F. J. García Vargas). Entre el mencionado vertedero y el área de Tahíche, Arrecife, hay 10 aves el 6 de abril y 16 aves el 8 de abril de 2007 de las cuales 7 permanecen por la zona hasta al menos el 17 de octubre de 2007 (F. J. García Vargas, J. Sagardía y A. Unquiles), observándose seis aún el 24 de noviembre de 2007 (F. J. García Vargas y A. Unquiles). Una de las aves vista en estas fechas últimas en Lanzarote es la misma mencionada más abajo vista en El Hierro. En Gran Canaria, una sobrevolando Las Ré mudas, Telde, el 4 de enero de 2007 (M. A. Suárez). En Tenerife, grupo de 10 aves alimentándose en las instalaciones de la planta de tratamiento de residuos sólidos en Arico el 19 de abril de 2007 (A. J. Curbelo), y dos aves entre el 31 de marzo y el 3 de abril de 2007 en las inmediaciones de El Sobradillo, El Rosario (J. A. Segredo). En El Hierro, ejemplar capturado en mal estado en Tefirabe, Valverde el 12 de septiembre de 2005 (J. M. Hernández) y liberada después; el individuo en cuestión está anillado y podría tener un origen portugués, aunque aún no ha podido confirmarse. En fechas posteriores fue visto por los llanos de Aitemés,

cerca de San Andrés, el 19 de febrero de 2006 (D. P. Padilla, J. C. Illera y A. Rodríguez), los días 3 y 6 de agosto de 2006 (N. Herrera y B. González) y sobrevolando San Andrés en octubre de 2006 (J. A. Lorenzo). En La Palma, tres aves en el vertedero de Barranco Seco, Puntallana, los días 2 y 3 de abril, dos los días 5 y 6 de abril y sólo una los días 9 y 10 de abril de 2007 (R. Burton), así como una el 9 de abril de 2007 en el Hoyo de Mazo, Mazo (V. Ojeda).

Morito común

Plegadis falcinellus

Un ejemplar en periodo invernal en el Paraje Natural de la Desembocadura del Guadalhorce, Málaga, el 26 de noviembre de 2006 (A. Tamayo) y otro individuo joven los días 20 y 21 de octubre de 2007 (A. M. Pérez). Un individuo en la laguna Gente, Valdepolo, León, el 22 de abril de 2007 (H. Astiárraga y S. de Elera). Alrededor de 150 individuos en la laguna de la Janda, Vejer de la Frontera, Cádiz, el 10 de septiembre de 2007 (M. Jiménez Cintado). Un bando compuesto por alrededor de 900 aves en los arrozales de Cantarita, Isla Mayor, Sevilla, el 28 de octubre de 2007 (F. Chiclana).

Canarias. En Tenerife, uno el 6 de julio de 2007 en charcas de riego entre Tejina y Bajamar (M. Fernández del Castillo), visto de nuevo el 12 de julio de 2007 (J. A. Pérez de la Rosa y M. Déniz) y por último el 12 de agosto de 2007 (J. C. Adam).

Espátula común

Platalea leucorodia

Un grupo de 43 ejemplares pasan el invierno en el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Noja y Joyel, Cantabria; se observan durante los meses de diciembre de 2006 y enero y febrero de 2007 (V. Iturriaga y J. Aja). En este humedal se han contabilizado 1.658 ejemplares diferentes durante el paso postnupcial durante el mes de septiembre de 2007 (V. Iturriaga). Cuatro y dos ejemplares

en la cola del embalse de Cazalegas, Toledo, el 1 y el 4 de abril de 2007, respectivamente (C. Pontegnie).

Flamenco común

Phoenicopterus roseus

Un individuo en una balsa junto a un canal de riego en Olías del Rey, Toledo, el 28 de agosto de 2007 (J. I. Medina).

Elanio común

Elanus caeruleus

Dos aves en Olivares, Sevilla, el 1 de mayo de 2007 (A. Domínguez Polvillo). Un ejemplar en la Junta de los Ríos en el río Guadalhorce, Málaga, el 21 de julio de 2007 (S. Peregrina, Á. García, Á. F. García y P. Gallego). Un individuo cazando en los cultivos de la margen derecha del río Guadalhorce, Alhaurín de la Torre, Málaga, el 9 de septiembre de 2007 (J. A. Cortés). Tres o cuatro ejemplares en la laguna de Sentiz, Valdepolo, León, el 3 de noviembre de 2007, cazando al anochecer en una zona de monte de roble melojo (*Quercus pyrenaica*) alternando con campos de cultivos, mostrando comportamientos territoriales ante una hembra de aguilucho pálido y otra de aguilucho lagunero (T. Sanz y M. Postigo).

Milano negro

Milvus migrans

Registros en invierno en la provincia de Segovia en noviembre 2007: dos individuos junto con 33 milanos reales en el vertedero de Navalmanzano, el día 21 y uno acompañando a cuatro milanos reales en el paraje de los Porretales, Valdeprados, el día 23 (J. L. González del Barrio).

Alimoche común

Neophron percnopterus

Ingresa en el Centro de Recuperación de Animales de Martioda un pollo de corta edad con el plumaje sin completar su crecimiento: el ejemplar fue recogido cerca de una zona de cría en la sierra de Arcamo, Jókano, Kuartan-



Alimoche común *Neophron percnopterus*. Sierra de Arcamo (Álava). Foto: J. Dorado.

go, en Álava, el 16 de octubre de 2007; no se observaron adultos en los alrededores (Laura Elorza y M. Rabanal).

Buitre leonado

Gyps fulvus

Se localizan nuevas colonias en la provincia de Valladolid en los términos de Curiel de Duero, Peñafiel y Olmos de Peñafiel en 2007, que se suman a la detectada en 2006 (véase *Ardeola*, 53: 382; Del Moral y Martí, 2001); en esta provincia no se detectaron colonias durante el censo de 1999 (A. Alonso Rodríguez). Un ejemplar en vuelo entre de Irixoa y Aranga, A Coruña, del 26 al 28 julio de 2007 (J. C. Fernández Serantes).

Buitre negro

Aegypius monachus

Avistamiento fuera de las áreas habituales: Un individuo en el entorno de Gaucín, Málaga, el 10 de octubre de 2006 (A. R. Muñoz). un ejemplar en Brieva de Cameros, La Rioja, el 30 de mayo de 2007 (J. Serradilla). Un ave en Soto de Valderrueda, León, el 22 de julio de 2007 (T. Sanz). Tres individuos en Santa Cruz de los Cuérragos, Zamora, el 25 de septiembre de 2007 (R. Noriega y F. Roviralta).

Culebrera europea

Circaetus gallicus

Un ejemplar en la Sierra de la Alpujata, Níjar, Málaga, en actitud migratoria y en dirección al Estrecho, el 19 de diciembre de 2006 (F. Ríos). Un ave volando entre Málaga y Campanillas en dirección a los Montes de Málaga, Málaga, el 20 de diciembre de 2006, sin actitud migratoria y sí en vuelo divagante (J. A. Cortés).

Aguilucho lagunero occidental

Circus aeruginosus

Canarias. En Gran Canaria, observaciones en fechas poco habituales; una hembra en la charca de la Marquesa, Arucas, el 22 de julio de 2007 y otra hembra en Aldea Blanca, San Bartolomé de Tirajana, el 10 de agosto de 2007 (M. A. Suárez y E. Hernández).

Águila imperial ibérica

Aquila adalberti

Un individuo inmaduro en Mojados, Valladolid, el 23 de marzo de 2007 (P. Decimavilla). Un ave posada en apoyo eléctrico en Pina de Ebro, Zaragoza, el 16 de octubre de 2007 (O. Lorén y Ó. Sánchez Morate).

Aguililla calzada

Hieraaetus pennatus

Canarias. Irrupción de aves en el paso otoñal de 2006, permaneciendo algunos ejemplares



Aguililla calzada *Hieraaetus pennatus*. Morro Jable (Pájara, Fuerteventura). Foto: G. Peña.

res todo el invierno en algunas islas. En Fuerteventura, dos aves de fase clara en Morro Jable, Pájara, el 8 de septiembre de 2006 (G. Peña). En Gran Canaria, en distintas localidades de Telde, como La Majadilla, La Pardilla, el barranco de Telde y Las Rémudas, desde el 26 de octubre de 2006 al 13 de agosto de 2007: se observan dos aves de morfo claro los días 15 de enero, 22 de enero y 3 y 12 de febrero, así como una el 1 y el 4 de enero, el 16 de febrero, y los días 1, 5 y 26 de marzo, siendo la última cita la del 13 de agosto de 2007 en Las Rémudas (M. A. Suárez). En esta misma isla, otra de morfo claro sobrevolando la Charca de Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana, el 17 de febrero de 2007 (M. A. Suárez). En Tenerife, una de fase clara sobrevolando el malpaís de Güimar, Güimar, el 14 de febrero de 2007 (B. Fariña); una de fase clara en la punta de Rasca el 2 de marzo y otra de fase clara el 3 de marzo de 2007 en el pico del Inglés, Santa Cruz de Tenerife (J. Muddeman); tres de fase clara en la charca de El Fraile el 4 de marzo de 2007 (V. Díaz) y en esa misma charca, una de fase clara el 21 de marzo de 2007 (E. J. Alblas); una en mal estado recogida por La Atalaya, Tacoronte, el 24 de marzo de 2007 (J. Guerra); una de fase clara el 26 de septiembre de 2007 en charcas de riego en Tejina, La Laguna (C. Hernández); en los llanos de Los Rodeos, una de fase clara el 15 de noviembre de 2006 y el 8 de febrero de 2007, y en las proximidades de El Sobradillo, El Rosario, una de fase clara el 9 de marzo de 2007 (J. A. Lorenzo). En La Palma, dos ejemplares el 5 de marzo de 2007 cerca de Santa Cruz (L. Stegeman).

Águila-azor perdicera

Hieraaetus fasciatus

Un individuo adulto en Vegaquemada, León, el 22 de mayo de 2007 (T. Sanz).

Águila pescadora

Pandion haliaetus

Un ejemplar en el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Noja y Joyel, Cantabria, se

observa desde principios de noviembre a finales de febrero (F. González Sánchez y V. Iturriaga). Un individuo en época reproductora en la Corta de los Olivillos, río Guadalquivir, Puebla del Río, Sevilla, el 9 de junio de 2007 (F. Chiclana).

Cernícalo patirrojo

Falco vespertinus

Se observa un individuo posado en unos chopos con actitud de caza en Campo Azálvaro, Segovia, el 22 de mayo de 2007 (J. A. Fargallo).

Esmerejón

Falco columbarius

Observación tardía de dos aves en la salina Nuestra Señora de los Dolores, San Fernando, Cádiz, el 23 de abril de 2007 (M. Jiménez Cintado).

Halcón de Eleonora

Falco eleonora

Un individuo en la Sierra de Alpujata, Mijas, Málaga el 11 de septiembre de 2006 y otros dos ejemplares juntos el 12 de septiembre de 2006 (F. Ríos). Un ave en la Laguna de Navalayegua, Cantalejo, Segovia, el 22 de junio de 2007 (J. Risueño).

Canarias. En Gran Canaria, grupo de cinco en los llanos de la Pez, Tejeda, el 22 de julio de 2007 (M. A. Suárez y E. Hernández).



Halcón de Eleonora *Falco eleonora*. Laguna de Navalayegua (Cantalejo, Segovia). Foto: J. Risueño.

Polluela pintoja

Porzana porzana

Un individuo cantando incesantemente en las graveras de Gaceo, Álava, el 17 de marzo de 2007 (G. Belamendia).

Polluela bastarda

Porzana parva

Dos ejemplares, un macho y una hembra, en el Brazo del Este, Sevilla, el 12 de abril de 2007 (F. Chiclana). Un macho y una hembra en la laguna de Sariñena, Huesca, el 8 de abril de 2007 (M. Quintana y C. O. Ania).

Corrección: La cita recogida en *Ardeola* 54: 176 en el embalse de Granda, Gozón, Asturias, corresponde a una polluela pintoja (*Porzana porzana*) y no a polluela bastarda como se indicaba.

Focha moruna

Fulica cristata

Una pareja que alimenta a siete pollos crecidos en la Calatilla, Marismas del Odiel, Huelva, el 5 de mayo de 2007 (F. Chiclana). En Asturias, en el embalse de Furacón, Oviedo: en octubre de 2007, un ejemplar junto a fochas comunes el día 21 (M. Quintana y M. F. Pajuelo) y el día 28 (M. Quintana y C. O. Ania).

Grulla común

Grus grus

Nueve ejemplares en las salinas de Cabo de Gata, Almería, el 24 de octubre de 2007 (D. Elliot-Binn y R. Gunn).

Avutarda común

Otis tarda

Un bando de 15 ejemplares, con al menos un macho, que realizó en dos ocasiones exhibiciones de cortejo, en la ZEPA "Estepas de Yecla", Murcia, el 24 de febrero de 2007. Existen pocos registros recientes de cortejo de avutarda en la Región de Murcia. (L. Aznar y J. M. Sánchez Balibrea).

Ostrero euroasiático

Haematopus ostralegus

Avistamiento en el interior: cuatro ejemplares en el embalse de Entrepeñas, Guadalajara, el 15 de abril de 2007 (V. Merino). Se localizan tres parejas en isla de Santa Marina, Cantabria, durante un censo de gaviotas y charranes, durante el mes de junio de 2007 (F. González Sánchez e I. Fernández Calvo).



Ostrero euroasiático *Haematopus ostralegus*. Embalse de Entrepeñas (Guadalajara). Foto: V. Merino.

Avoceta común

Recurvirostra avosetta

Canarias. En Gran Canaria, una en la costa de Tenefé, Santa Lucía, el 16 de marzo de 2007 (M. A. Suárez).

Alcaraván común

Burhinus oedicnemus

Unos 500 alcaravanes en la laguna de Fuente de Piedra, Málaga, el 3 de noviembre de 2007 (A. M. Pérez). Bando de 47 aves en Olivares, Sevilla, el 3 de enero de 2007 (A. Domínguez Polvillo). Observación de siete ejemplares en el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Noja y Joyel, Cantabria, el 5 de enero de 2007 (F. González Sánchez y V. Iturriaga).

Canastera común

Glareola pratincola

Concentración postnupcial de alrededor de 3.800 ejemplares, la mayoría jóvenes del



Canastera *Glareola pratincola*. Brazo del Este (Sevilla). Foto: F. Chiclana.

año, en el Brazo del Este, Sevilla, el 18 de agosto de 2007 (F. Chiclana).

Chorlitejo patinegro

Charadrius alexandrinus

Canarias. En Gran Canaria, en la Charca de Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana, el 25 de mayo de 2007 se censan nueve ejemplares, seis adultos y tres pollos, aunque el 30 de junio de 2007 sólo estaban los adultos y se sospecha la muerte de las crías por depredación (M. A. Suárez).

Chorlito carambolo

Charadrius morinellus

Nueve ejemplares a unos 300 m de la cumbre del Chullo, Sierra Nevada, Almería, el 19 de septiembre de 2007 (F. Jiménez López). Un individuo en el puerto de Fuengirola, Málaga, el 10 de noviembre de 2007 (S. Solís).

Canarias. En Fuerteventura, grupo de 36 en el istmo de La Pared, Jandía, Pájara, el 4 diciembre 2004 (J. Lowen). En Tenerife, uno el 5 de octubre de 2004 en el malpais de Rasca, Arona (H. Domínguez, R. Caro, J. A. Pérez e I. Gómez).

Chorlito dorado europeo

Pluvialis apricaria

Canarias. En Fuerteventura, dos aves en la costa entre El Cotillo y Corralejo, La Oliva, el

28 de octubre de 2006 (M. Villaécija, J. L. Anguita, M. A. Hernández y F. Chiclana).

Correlimos gordo

Calidris canutus

Un ave con plumaje de invierno en la R. N. Las Cañas, Viana, Navarra, el 24 de diciembre de 2006 (J. Serradilla, F. J. Robres, O. Gutiérrez y E. Ayala). Un bando de 343 aves en las Marismas del Odiel, Huelva, el 5 de mayo de 2007 (F. Chiclana). Un ejemplar juvenil se alimenta junto a otro grupo de limícolas, en el embalse de El Vellón, Guadalix de la Sierra, Madrid el 28 y 30 de agosto y 3 y 6 de septiembre de 2007 (D. Díaz Díaz).

Canarias. En Tenerife, grupo de unos 40 ejemplares vistos en vuelo en alta mar, a unas tres millas de la costa de Playa de San Juan, Guía de Isora, el 13 de mayo de 2007 (V. Boehlke).



Correlimos gordo *Calidris canutus* Embalse de El Vellón (Madrid). Foto: D. Díaz Díaz.

Correlimos tridáctilo

Calidris alba

Tres ejemplares en la balsa Santa Cristina, Santa Cristina del Páramo, León, el 6 de mayo de 2007 (D. Miguélez).

Correlimos oscuro

Calidris maritima

Un ave en Punta de Calaburra, Mijas Costa, Málaga, el 27 de febrero de 2007 (F. Ríos y



Correlimos oscuro *Calidris maritima*. Desembocadura del Guadalhorce (Málaga). Foto: J. A. Senecianes.

B. López). Un ejemplar en Benalmádena Costa, Málaga, el 4 de abril de 2007 (B. López). Un ave con plumaje nupcial en Punta de Calaburras, Mijas Costa, Málaga, el 5 de mayo de 2007 (J. M. Moreno, F. Fernández y B. López). Un grupo de ocho aves en la costa norte de Santander, Cantabria, el 11 y 12 de enero de 2007 (F. González Sánchez). Un individuo joven junto con chorlitos dorados en cabo Peñas, Gozón, Asturias, el 15 de septiembre de 2007 (M. Quitana y C. O. Ania).

Aguja colipinta

Limosa lapponica

Observación en el interior peninsular: primera cita para La Rioja, un ave en el embalse de Leiva-Tormantos, el 11 de septiembre de 2007 (J. Serradilla). Observación en el interior: un ave en la R. N. de las Cañas, Viana, Navarra el 13 de septiembre de 2007 (J. Serradilla y E. Ayala).

Zarapito trinador

Numenius phaeopus

Observación en el interior: avistamiento de 82 ejemplares en el río Guadalquivir, a su paso por Trebujena, Cádiz, a unos 40 km de la costa, el 29 de abril de 2007 (G. Ocio y F. Chiclana).

Zarapito real*Numenius arquata*

Un ave sobrevuela una zona de monte mediterráneo en la ermita de Setefilla, Sierra Norte de Sevilla, el 15 de junio de 2007 (M. Villaécija y F. Chiclana).

Archibebe fino*Tringa stagnatilis*

Un individuo en el Paraje Natural de la Desembocadura del Guadalhorce, Málaga, el 20 de septiembre de 2006 (A. Paterson, A. M. Pérez, F. Ríos, A. Serrano y A. Tamayo). Un ejemplar con plumaje invernal en el Brazo del Este, Puebla del Río, Sevilla el 4 de octubre de 2007 (A. Lomeña y F. Chiclana).

Vuelvepedras común*Arenaria interpres*

Observaciones en el interior: en León, un ejemplar en la balsa de la Mata, La Mata del Páramo, y otro en la balsa de Villamañán 1, Villacé, León, el 6 de mayo de 2007 (D. Miguélez), y en La Rioja, dos aves en el embalse de Leiva-Tormantos, el 4 de septiembre de 2007 (J. Serradila).

Págalo pomarino*Stercorarius pomarinus*

Canarias. En Tenerife, uno en mal estado que acaba muriendo, recogido el 1 de mayo de 2007 en el litoral de El Pris, Tacoronte (C. Méndez y J. Hernández-Abad).

Gaviota cabecinegra*Larus melanocephalus*

Más de 400 gaviotas en varios bandos en la desembocadura del río Fuengirola, Málaga, el 28 de enero de 2007 (F. Ríos y S. Solís).

Gaviota enana*Larus minutus*

Presencia de dos aves en el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Noja y Joyel, Cantabria, durante el mes de enero de 2007 (V. Iturriaga). Un ejemplar de primer invierno en la

desembocadura del río Fuengirola, Málaga, el 28 de enero de 2007 (F. Ríos y S. Solís).

Gavión atlántico*Larus marinus*

Primera observación en la provincia de Granada: un individuo juvenil con plumaje de transición a primer invierno en un bando de unas 300 gaviotas sombrías en Rada de Varadero, Puerto de Motril, el 15 de septiembre de 2007 (J. Garzón y B. Ramos). Primeras citas de cría para España: una pareja intentó criar en 2004 en los islotes de Farallóns, Cervo, Lugo (A. Bermejo y J. Mouriño), consiguió sacar dos pollos en 2005 (J. Mouriño) y ha vuelto a reproducirse en 2006 y 2007 (José Luis Salaverri). En 2007 se localiza una nueva pareja en la provincia de La Coruña en el islote de Peña Furada, Ortigueira: el 23 de abril de 2007 se localiza la pareja formada por sendos ejemplares adultos, con claro comportamiento territorial, inmersa en una pequeña colonia de gaviota patiamarilla. Diversas observaciones realizadas a lo largo del mes de mayo confirman la ocupación de un territorio y la construcción de nido. Sin embargo, en los últimos días de ese mes y en los primeros de junio las aves han desertado de la zona por motivos desconocidos, resultando un intento de cría frustrado (Á. Barros, R. Martí, C. D. Romai y R. Hevia).

Gaviota tridáctila*Rissa tridactyla*

Un ejemplar en plumaje de invierno en el puerto de Málaga, el 15 de marzo de 2006 (A. García).

Pagaza piconegra*Sterna nilotica*

Un individuo en la balsa Villamañán 2, Zuares del Páramo, León el 23 de junio de 2007 (D. Miguélez).

Pagaza piquirroja*Sterna caspia*

Cuatro aves adultas en la playa de Montijo, Chipiona, Cádiz, el 2 de junio de 2007 (R. García, M. Villaécija y F. Chiclana).

Charrán patinegro*Sterna sandvicensis*

Exhibición y cortejo de una pareja en la playa de la Jara, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, el 14 de julio de 2007 (F. Chiclana).

Charrán común*Sterna hirundo*

Hasta 31 nidos se localizan en el muelle de Raos, bahía de Santander, Cantabria, durante los meses de mayo a agosto de 2007 (F. González Sánchez y I. Fernández Calvo). Dormidero con alrededor de 2.200 aves en las salinas de la Tapa, Puerto de Santa María, Cádiz, el 10 de agosto de 2007 (R. García Costales y F. Chiclana).

Charrán ártico*Sterna paradisaea*

Cita en el interior: un individuo adulto en la balsa Santa Cristina, Santa Cristina del Páramo, León el 1 de octubre de 2006 (D. Miguélez).

Charrancito común*Sterna albifrons*

Un ave en la balsa Villamañán 1, Villacé, León el 23 de julio de 2006 (D. Miguélez).

Fumarel aliblanco*Chlidonias leucopterus*

Dos ejemplares en la laguna de Fuente de Piedra, Málaga, el 12 de septiembre de 2006 (J. M. Ramírez). Dos aves juveniles en el Paraje Natural de la desembocadura del Guadalhorce, Málaga, el 17 de septiembre de 2007 (A. Paterson).

Alca común*Alca torda*

Avistamiento de un individuo con plumaje de verano en el Parque Natural de las Maris-

mas de Santoña, Noja y Joyel, Cantabria, el 21 de junio de 2007 (V. Iturriaga). Tres ejemplares inmaduros en el interior de la ría de Avilés, Asturias, el 1 de junio de 2007 (M. Quintana y C. O. Ania).

Frailecillo atlántico*Fratercula artica*

Canarias. En Tenerife, ave en mal estado recogida en el Puertito de Güímar, Güímar, el 16 de diciembre de 2006 y entregada al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre del Cabildo de Tenerife (A. J. Curbelo).

Ganga ortega*Pterocles orientalis*

Canarias. En Lanzarote, un macho en llanos de Los Ancones, Teguisse, el 8 de julio de 2007 (F. J. García Vargas y J. Sagardía).



Ganga ortega *Pterocles orientalis*. Los Ancones (Teguisse). Foto: F. J. García Vargas.

Ganga ibérica*Pterocles alchata*

En la Región de Murcia donde existen muy pocos registros de la especie: un bando de entre 16-18 aves en la ZEPA "Estepas de Yecla", Yecla, Murcia, el 11 de febrero y el 24 de febrero de 2007; con posterioridad, el 11 de marzo, se observa un grupo de seis ejemplares en vuelo y reclamando (L. Aznar y J. M. Sánchez-Balibrea).

Paloma torcaz*Columba palumbus*

Canarias. En Gran Canaria, un adulto visto en Los Tilos, Moya, el 24 de marzo de 2007 (K. Betton).

Tórtola senegalesa*Streptopelia senegalensis*

Canarias. En Gran Canaria, en la Charca de Maspalomas, San Bartolomé de Tirajana, hasta tres machos cantando y en cortejo el 24 de marzo de 2007, y el 14 de julio de 2007 se detecta un adulto acompañado con un juvenil que delata su nidificación en la zona (M. A. Suárez).

Cotorra argentina*Myopsitta monachus*

Primer caso de nidificación en un edificio en Madrid (véase Martín, 2006): observación de al menos una pareja construyendo el nido en la iglesia de San Agustín de Guadalix, el 27 de mayo de 2007; el nido se apoyaba entre la malla metálica que cierra uno de los laterales del campanario y el muro de piedra (R. Martí).

Críalo europeo*Clamator glandarius*

Un ejemplar en periodo invernal en el Paraje Natural de la Desembocadura del Guadalhorce, Málaga, el 26 de noviembre de 2006 (A. Tamayo).

Lechuza común*Tyto alba*

Reproducción tardía, posiblemente debido a la plaga de *Microtus arvalis*: dos pollos a medio emplumar en Matallana de Valmadrigal, León, el 11 de octubre de 2007 (T. Sanz).

Búho chico*Asio otus*

Reproducción tardía posiblemente debido a la plaga de *Microtus arvalis*: un ejemplar volandero en Valencia de Don Juan, León, el 7 de octubre de 2007 (T. Sanz).

Búho campestre*Asio flammeus*

Se confirma de nuevo la cría de la especie en la comarca de La Moraña, Ávila (la primera cita está fechada en 1997): se detectan dos nidos el 1 de mayo de 2007 (J. García Saez). Se recoge un ejemplar volantón atropellado en Quintanilla de los Oteros, León, y se observan otras dos aves en las inmediaciones, el 5 de junio de 2007 (T. Sanz). Un ejemplar en el Paraje Natural de la desembocadura del Guadalhorce, Málaga, en vuelo desde la Laguna Grande a la Laguna Escondida, el 11 de noviembre de 2007 (J. Fregenal y A. Lupión). Un ejemplar en el aeropuerto de Málaga, en la mediana de las pistas, el 11 de noviembre de 2007 (T. Todorov).

Chotacabras pardo*Caprimulgus ruficollis*

Cita de reproducción tardía: una hembra con dos pollos de pocos días, en el campo de vuelo del aeropuerto de Málaga, el 29 de agosto de 2007 (M. A. Farfán, J. Duarte y J. C. Guerrero).

Vencejo Cafre*Apus caffer*

Un ejemplar en la sierra de la Plata, Cádiz, el 30 de agosto de 2007 (F. del Valle y F. Chiclana).

Abejaruco europeo*Merops apiaster*

Canarias. En La Palma, donde hay pocos datos recientes, ejemplar en las inmediaciones de Puerto Naos, Los Llanos de Aridane, el 25 de marzo de 2007 (R. Pedrianes).

Carraca europea*Coracias garrulus*

Se observa un ejemplar en Laguardia, Álava, el 13 de mayo de 2007 (J. C. Barroso, I. Portu, R. García de Albéniz y V. González de Mendoza). Hasta nueve aves en la Torre de San Antonio, Olivares, Sevilla, el 10 de junio de 2007 (A. Domínguez Polvillo).



Carraca europea *Coracias garrulus*. Juncalillo (San Bartolomé de Tirajana). Foto: M. A. Suárez.

Canarias. En Gran Canaria, una en Juncalillo, San Bartolomé de Tirajana, el 12 de mayo de 2007 (M. A. Suárez y E. Hernández).

Torcecuello euroasiático

Jynx torquilla

Canarias. En La Palma, en una huerta de La Laguna, Los Llanos de Aridane, uno el 18 de marzo de 2006 (I. Brito).

Picamaderos negro

Dryocopus martius

Un ejemplar entre los puertos de Navafría y Somosierra, sierra de Guadarrama, Madrid, a 1.792 m de altitud en una zona de extensas repoblaciones de pino silvestre, el 15 de julio de 2007 (L. M. Carrascal).

Pico menor

Dendrocopos minor

Un individuo en el río Vélez, entre el puente y la desembocadura, Málaga, el 29 de septiembre de 2007 (I. Lozano y S. Peregrina).

Calandria común

Melanocorypha calandra

Agrupación en fecha temprana de unas 350 aves en la finca de los Caracoles, P. N. Doñana, Aznalcázar, Sevilla, el 7 de junio de 2007 (M. Martín y F. Chiclana).

Terrera común

Calandrella brachydactyla

Canarias. En Fuerteventura, observación invernal: un ejemplar junto a terreras marismas en las dunas del jable de Jandía, Pájara, entre el 24 y el 31 de diciembre de 2006 (A. Degollada y L. Cera).

Avión roquero

Ptyonoprogne rupestris

Avistamiento en fechas muy tempranas de pollos volantes en Azados, León, el 22 de marzo de 2007; posiblemente arrastrados a la zona tras unas condiciones primaverales y posterior temporal de nieve (A. García Vázquez).

Golondrina común

Hirundo rustica

Se observa un ejemplar con rasgos morfológicos que sugieren la hibridación con avión común: acompañaba a un grupo de golondrinas y se observó posada sobre un muro y sobrevolando el río Darro, a su paso por la ciudad de Granada, los días 4, 5 y 6 de mayo de 2007. Presentaba un tamaño y aspecto tipo golondrina común, pero con cola ahorquillada aunque más corta, sin las típicas manchas blancas en la rectrices, con un color más apagado y más parecida a la del avión común; conspicuo obispillo de color blanco sucio, con apariencia de escamas, y diseño facial muy similar al de una golondrina pero sin el collar típico (J. P. Pérez Contreras y B. Pérez Machado). Enorme dormidero en las Marismas de Alday, Cantabria, en el que se llega a contar hasta 7.000 ejemplares durante el mes de septiembre de 2007 (F. González Sánchez y Á. Cobo).

Golondrina dáurica

Hirundo daurica

Un ejemplar volando junto con aviones roqueros en las Hoces del Curueño, Tolibia de Abajo, León, el 14 de julio de 2007 (J. M. Fernández García, M. González y N. Ruiz de Azúa).

Bisbita de Richard*Anthus richardi*

Avistamientos de un ejemplar en el Paraje Natural de la Desembocadura del Guadalhorce, Málaga: en noviembre de 2006, el día 17 (B. López), el día 25 (A. Tamayo, E. Alba y M. Garrido), el 26 (A. Tamayo y A. Paterson) y el día 28 (A. Tamayo) y, en 2007, el 7 de enero (A. M. Pérez) y el 2 de octubre (A. M. Pérez).

Bisbita gorgirrojo*Anthus cervinus*

Canarias. En Gran Canaria, tres en Juncalillo, San Bartolomé de Tirajana, el 3 de marzo de 2007 (M. A. Suárez y E. Hernández).

Ruiseñor común*Luscinia megarynchos*

Canarias. En Gran Canaria, donde hay pocos datos: uno en Telde el 14 de mayo de 2007 (M. A. Suárez).

Colirrojo tizón*Phoenicurus ochruros*

Canarias. En Gran Canaria, una hembra en las proximidades del puerto de La Aldea, San Nicolás de Tolentino, el 16 de enero de 2007 (G. Olioso y M. Olioso). En La Palma, en zona recreativa de El Fayal, cerca de Puntagorda, macho en octubre de 2006 (C. Kasche).

Roquero rojo*Monticola saxatilis*

Un macho en Bocos de Duero, Valladolid, el 24 de junio de 2007 (P. Decimavilla y A. Valentín).

Mirlo capiblanco*Turdus torquatus*

Primera cita de cría confirmada en una localidad de la sierras exteriores del Prepirineo aragonés: un adulto y un pollo colicorto en Poljé de Abeles, Nueno, Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, Huesca, el 29 de mayo de 2007; hasta ahora la población nidificante

estaba circunscrita en Aragón al Pirineo Axial y a algunas localidades de las Sierra Prepirenaicas Interiores, con límite meridional en Oturia y Sierra de Sis (E. Escudero y P. A. Brotons). Un ave a 2.300 m en la Acequia de los Hechos, Sierra Nevada, Almería, el 6 de octubre de 2007 (F. Jiménez López).

Curruca tomillera*Sylvia conspicillata*

Nido con dos pollos totalmente emplumados en una localidad del municipio de O Bolo, Orense, el 26 de mayo de 2007 (J. C. Epifanio y J. González Loroño).

Curruca zarcera*Sylvia communis*

Primera cita de nidificación de la especie en Ceuta: dos adultos y tres pollos volanderos alrededores del Fuerte San Francisco de Asís, el 10 de junio de 2007 (J. Sánchez Espinosa).

Curruca capirotada*Sylvia atricapilla*

Cría en el Jardín Botánico de Valencia: se capturan diferentes ejemplares de machos, hembras con placa incubatriz y jóvenes del año, en una estación de anillamiento ubicada en este lugar durante los meses de junio y julio de 2007 (J. L. Greño).

Alcaudón dorsirrojo*Lanius collurio*

Un macho junto a una hembra o pollo en Noguera, Teruel, en una zona de pastizales con pequeños setos a 1.423 m de altitud, el 6 de julio de 2007 (L. M. Carrascal).

Urraca*Pica pica*

Un ejemplar de origen desconocido en el Parador de Golf de Málaga, el 27 de marzo de 2007; aunque común en otras provincias vecinas, en la de Málaga es excepcional, sin que se sepa muy bien a qué es debido y, parece ser, que la mayor parte de las observaciones

corresponden a aves escapadas o puestas en libertad (B. López y P. Macaulay).

Tejedor amarillo

Euplectes afer

Alrededor de 200 aves, incluyendo algunos machos con plumaje nupcial, en arrozales de Isla Menor, Puebla del Río, Sevilla, el 27 de septiembre de 2007 (F. del Valle, M. Martín, M. Romero y F. Chiclana). Capturado en una sesión de anillamiento un ave en el carrizal de los Albardales, S. Martín de la Vega, Madrid, el 29 de septiembre de 2007 (SEO-Monticola).

Pico de Coral

Estrilda astrild

Avistamiento de cuatro adultos y un joven junto a un arroyo en torno a los Astilleros, Salinas de Bonanza, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, el 1 de septiembre de 2007 (E. Muñoz Charro).

Corrección: La cita correspondiente a esta especie en *Ardeola*: 54: 183, corresponde en realidad a *Estrilda troglodytes*, así como la foto que se incluye en la parte superior de la página.

Estrilda de carita naranja

Estrilda melpoda

Se captura un macho adulto durante una sesión de anillamiento y se observan otras cuatro aves en Contraparada, Murcia, el 7 de octubre de 2007 (J. L. Murcia, A. Guardiola, F. García, I. Álvarez, J. Mompean, J. Martínez y M. Amat).

Verderón serrano

Serinus citrinella

Observación de 60 ejemplares en el puerto de la Ragua, Sierra Nevada, Almería, el 22 de septiembre de 2007 (F. Jiménez López y J. Garzón).

Camachuelo común

Pyrrhula pyrrhula

Dos aves en el arroyo de la Peguera, P. N. de la Sierra de los Alcornocales, Alcalá de los Gazules, Cádiz, el 20 de marzo de 2007 (M. Jiménez Cintado).

Picogordo

Coccothraustes coccothraustes

Primera cita de nidificación confirmada de la especie en la provincia de Alicante, y primera para toda la Comunidad de Valencia: en el Parque Natural de la Font Roja, Alcoy, en una sesión de anillamiento se captura una hembra de segundo año con placa incubatriz en regresión, el 4 de julio de 2007 (P. Cantó).

BIBLIOGRAFÍA

- DEL MORAL, J. C. y MARTÍ, R. 2001. *El Buitre Leonado en la Península Ibérica. III Censo Nacional y I Censo Ibérico coordinado, 1999*. Monografía n.º 7. SEO/BirdLife. Madrid.
- MARTÍN, M. 2006. La cotorra argentina (*Myiopsitta monachus*) en la ciudad de Madrid: expansión y hábitos de nidificación. *Anuario Ornitológico de Madrid* 2005: 76-95.
- MOLINA, B., MORENO-OPO, R. y LORENZO, J. A. 2006. Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, 53: 191-211.
- SEO-MÁLAGA. *Cuaderno de Campo*. www.seomalaga.org. Fecha de consulta: 10.01.2007.