

UNOS DATOS SOBRE NIDOS DE *AQUILA* *CHRYSAËTOS* EN CACERES

Joaquín ARAUJO

Solamente como aporte a la revisión de datos fenológicos de la reproducción del Aguila Real, doy a conocer la siguiente información propia, que expongo casi telegráficamente.

Se refiere a tres localidades del Este de la provincia de Cáceres, en Las Villuercas o zonas limítrofes, localidades que se designan por las letras H, J y P.

Localidad H: El 7.3.71, huevos expoliados en un nido por un paisano.—El 4.3.73, vuelos nupciales cerca de un nido que posee forro nuevo.

Localidad J: El 26.2.72, vuelos nupciales junto a un nido ocupado que aún no tiene huevos.—El 7.5.72, referencia verbal de haber un pollo muy crecido. En este caso, posible fecha de puesta a primeros de marzo, o después, dependiendo del ignorado estado de desarrollo del pollo el 7 de mayo.

Localidad P: El 15.5.71, 2 pollos bastante crecidos en nido.—El 19.3.73, un adulto incubaba y el 31.4.73 se ve entrar un adulto al nido, donde suponemos habría ahora algún pollo.

De lo expuesto, que se refiere a 6 diferentes periodos de crianza, se puede concluir que probablemente en la mayoría de ellas la puesta pudo ocurrir dentro de la primera mitad de marzo, y en alguna acaso ya a fin de febrero.

Todos los nidos de referencia se sitúan sobre riscos, entre los que cabe destacar el de la localidad H, que tiene solamente unos 12 metros de altura.

SUMMARY

The breeding chronology of the Golden Eagle is estimated for 6 periods in 3 nesting places of the province of Cáceres, Central SW. Spain. Egg-laying takes place mostly between 1-15 March, but apparently also in some case at the end of February.