

## NOTAS ORNITOLÓGICAS BREVES

### **COLIMBO GRANDE** (*Gavia immer*)

Un ejemplar, siempre cercano a la costa y en continuo buceo, fue observado el 19-XII-77 en la bahía de Cádiz. Se le vio también al día siguiente, y el 21 eran dos los Colimbos Grandes presentes en la zona (J. L. Paz, F. Solís y J. M. Lubián).

### **ESPATULA** (*Platalea leucorodia*)

En las marismas de Santoña (Santander) se localizó el 2-X-77 una bandada de 26 aves, bastante confiadas, de las que tres portaban anillas de colores que les fueron colocadas en sus colonias de cría holandesas. Otra visita el día 9 permitió observar un nuevo grupo de 17 Espátulas, con un ejemplar marcado por anillas coloreadas diferentes a las anteriormente reseñadas (J. Aja y J. García Ojiva).

### **MORITO** (*Plegadis falcinellus*)

J. A. de Albert Muntadas comunica la caza de dos Moritos en la laguna de La Encanyssada, Delta del Ebro, el 27-IX-74. Nos parece inadmisibile la reiteración con que se abaten especies protegidas y más en esta laguna —Coto Nacional de Caza—, donde Icona teóricamente controla las tiradas.

### **FLAMENCO** (*Phoenicopterus ruber*)

Durante el mes de octubre de 1977, una bandada de Flamencos visitó la ensenada de San Simón en la ría de Vigo, siendo la primera vez que se cita la especie en Galicia.

La primera observación se realizó casualmente el 9-X, al transitar por la carretera N-550, viendo unas 25 aves en vuelo W-E que terminaron posándose. En una segunda visita, el día 14, localizamos las aves en la orilla Este de las islas Alvedosas, constatando que el grupo se componía de 11 individuos, algunos inmaduros.

Como el día 12 el periódico *Faro de Vigo* publicó la noticia de haber cobrado los cazadores varios Flamencos, nos pusimos en contacto con uno de ellos, don Darío Durán, quien nos comunicó que habían capturado el 9

cinco aves en las proximidades de las Alvedosas, llevando dos ejemplares heridos al zoológico de Vigo; también dijo haber visitado de nuevo la zona el día 10, para filmarlos, viendo que el bando tenía 14 aves. La diferencia numérica con nuestra observación del 14 puede deberse a que las fechas del 12 y 13 fueron hábiles para la caza.

De los Flamencos cazados, uno lo conserva naturalizado el Sr. Durán, otro fue enviado a la Estación Biológica de Doñana y otro permanece vivo en el zoo. Todos eran inmaduros y dos portaban sendas anillas plásticas de color amarillo con las inscripciones, en negro, ARS y AYL respectivamente.

Hacia 1960, el padre de uno de nosotros (Bárcena) vio un Flamenco posado en la marisma a 50 m. de la gasolinera de Pontesampaio, a unos 800 m. de las Alvedosas. En el invierno de 1975 fue abatido en La Limia (Orense) un Flamenco de la subespecie americana *ruber*, que se conserva disecado en Ginzo (F. Bárcena, E. Fernández de la Cigüña y A. Villarino).

### **PATO MANDARIN** (*Aix galericulata*)

Un macho de esta especie fue cazado el 1-XI-75, en un caño de la marisma cercano a la localidad onubense de Punta del Moral (J. Cabot).

### **PORRON BASTARDO** (*Aythya marila*)

El 9-VIII-77, fueron observados cuatro machos de Porrón Bastardo en el embalse de Santillana (Madrid), en compañía de Anades Reales, Porrones Comunes, Fochas y Gaviotas Reidoras (L. M. González García).

### **PORRON PARDO** (*Aythya nyroca*)

C. Sanabria, F. Carbajo y F. de Lope, del Grupo Ornitológico de Extremadura *Ciconia*, exponen sus observaciones sobre esta escasa Anátida en Badajoz, tras tres inviernos de atención continua.

15-II-76, embalse de Cornalvo (Mérida): un macho, en un grupo de Anade Real. 4-II-78: se localiza una pareja en la finca «El Almendros», término de Badajoz. El 11-II-78, en este mismo lugar, un cazador cobró un macho de esta especie, que nos cedió para naturalizarlo. Encontramos en este paraje diez Porrónes Pardos, cinco machos y cinco hembras, en otra visita el día 17. Se trata de charcas de escasa profundidad, que sirven de abrevadero al ganado, en campo abierto de encinar adhesado.

### **PORRON DE COLLAR** (*Aythya collaris*)

El 14-I-78 se observó un ejemplar macho en el estanque del Parque de Isabel la Católica. Gijón (Asturias). Acompañaba a las especies que habitualmente invernán en dicho recipiente acuático: Anade Real, Anade Friso, Anade Silbón, Porrón Moñudo, Porrón Común, Polla de Agua y Focha.

Su presencia fue notada al llamar la atención la falta de contraste entre flancos y dorso, habitual en los machos de *Aythya fuligula*. Otros rasgos diferenciales a destacar son: el par de bandas blancas en el pico, una fina en su base y otra gruesa tras la uña del ápice; la falta de moño y el abultamiento del pileo. También pudimos apreciar el collar de color marrón en la base del cuello, que se hace visible al estirarse el ave hacia arriba durante el impulso previo a la zambullida, detalle apenas conspicuo cuando el Porrón de Collar reposa.

El 17 de enero continuaba este ejemplar en el parque, permitiendo su mansedumbre el acercamiento hasta unos diez metros. Este ánade americano cría en Canadá y Norte de Estados Unidos, mientras que su área de invernada —muy extendida en latitud— abarca desde Panamá a la Columbia británica y Massachusetts. Parece lógico relacionar su presencia en Asturias con la ola de frío que ha castigado este invierno América del Norte (J. A. Diego y R. Fernández Revuelta).

### **PORRON OSCULADO** (*Bucephala clangula*)

Cobrada una hembra en La Encanyssada, Delta del Ebro, el 6-11-1976 (J. A. de Albert).

### **NEGRON ESPECULADO** (*Melanitta fusca*)

El 21-1-77 se observa un Negrón Especulado hembra en la playa de San Lorenzo de Gijón que permaneció en el lugar durante una semana. No es la primera vez que en este lugar se presenta la especie, puesto que —según cita de A. Noval— en octubre de 1971 se vieron seis ejemplares durante 17 días (J. A. Diego).

### **SERRETA MEDIANA** (*Mergus serrator*)

26-XI-76: en la laguna de la Tancada, Delta del Ebro, se ha cazado un macho que figura naturalizado en la colección de la casa del Coto de La Encanyssada (J. A. de Albert).

### **BARNACLA CARINEGRA** (*Branta bernicla*)

25-IX-77: entra un ave desde el mar a la ría de Villaviciosa, Asturias, donde permanece alimentándose un cuarto de hora antes de alejarse mar afuera (J. A. Diego).

11-XII-76: se caza una Barnacla Carinegra en La Encanyssada, Delta del Ebro, que se conserva disecada en la casa del Coto (J. A. de Albert).

### CISNE CHICO (*Cygnus bewickii*)

Fue abatido un ejemplar, de un grupo de tres aves, en el Canal Vell, Delta del Ebro, el 11-XII-76 (J. A. de Albert).

### QUEBRANTAHUESOS (*Gypaetus barbatus*)

El 2 de abril de 1977, se localiza en la Sierra de Cazorla una pareja de Quebrantahuesos acompañada de un joven, que recorren los parajes denominados loma de la Sagra, El Vadillo, arroyo del Valle y arroyo de Vaide-infierno. Simultáneamente, estaban presentes en la zona veintitrés Buitres Leonados, cuatro Alimoches y un Buitre Negro.

No cabe duda de que se trata de una pareja nidificante con el joven del año anterior, aún no emancipado. Desde 1971, fecha en que Valverde encontró un pollo totalmente emplumado en un nido a 1.700 mts., no se ha vuelto a observar la cría en Cazorla. Cabe reseñar que Cazorla es el único lugar de la geografía española donde encontrar las cuatro especies de necrófagos alados, aunque el Buitre Negro no anide (F. Sánchez y L. M. González García).

### AGUILA PERDICERA (*Hieraetus fasciatus*)

El 2-V-76, al atardecer, se observan juntas nueve Aguilas Perdieras adultas en la vertiente meridional de Sierra Morena de Córdoba. Pasaron en vuelo rectilíneo dirección NE, y a una altura aproximada de 50 mts. por un lugar cercano al nido de esta especie en pino piñonero, al que hacemos referencia en este volumen de *Ardeola* (J. Cabot; Pedro y Diego Jordano; J. Villasante).

### RATONERO CALZADO (*Buteo lagopus*)

10-III-78: F. Carbajo y F. de Lope localizan un Ratonero Calzado a las 10,25 horas en Valdecaballeros (Badajoz) que sobrevuela un sembrado de trigo con encinas dispersas. Este ejemplar busca sustento en recorridos pacíficos a poca altura sobre el suelo, de forma semejante a un *Circus pygargus*. Hostigado por un Elanio Azul, tras mostrarse indiferente en la primera acometida se revuelve presentando las garras en la segunda pasada, dándose a la fuga y posándose en postes telegráficos. Allí se muestra inactivo aunque circulan por las cercanías aves pequeñas como Cogujada Común, Verdellino, Triguero y Rabilargo. Desaparece, en vuelo rumbo NE, al mediodía.

Esa misma tarde y la siguiente una prospección intensa se reveló infructuosa, lo que parece indicar que la rapaz se encontraba de paso.

### MILANO NEGRO (*Milvus migrans*)

Observación de un ejemplar el 28-I-1976, planeando con dos Milanos Reales en los pinares de Aznalcázar, Sevilla (F. Fernández Parrón y J. Mellado).

**ELANIO AZUL** (*Elanus caeruleus*)

27-VIII-77: se localizan dos aves en el término de Torrecampo (Córdoba), a un kilómetro del pueblo en dirección San Benito. El área en que se vieron ambos ejemplares es un llano con tierras de labor y escasas encinas muy diseminadas (I. Romero y C. Fernández Delgado).

**HALCON ABEJERO** (*Pernis apivorus*)

Un nido de esta rapaz, situado en pino a 10 m. de altura y con el cuenco cubierto por hojas frescas de quejigo, se encontró el 8-VII-1977 en la sierra de Guadarrama, Madrid. Ocupado por un adulto incubante, en una visita diez días más tarde comprobamos la presencia de un pollo pequeño (J. L. Paz, F. Solís y J. M. Lubián).

**AGUILA PESCADORA** (*Pandion haliaetus*)

J. A. de Albert comunica varios datos sobre la especie en La Encanyssada, Delta del Ebro, algunos demostrativos de la descarada transgresión del decreto que la protege, inconcebible en un Coto Nacional regulado por Icona. 3-X-69: 1 ave cazada, portadora de anilla Mus. Zool. Helsinki Finland M-4128. Había sido anillada de pollo el 7 de julio de este mismo año en Vähäsimio. 1-X-71: 1 ejemplar cazado, hecho que se repite desgraciadamente el 15-IX-74 y el 4-X-74. Nuestro comunicante observa otra Aguila Pescadora en esta laguna el 3-X-76.

**HALCON COMUN** (*Falco peregrinus*)

J. A. Cano, F. Hernández Pérez y J. P. Sánchez Onteniente fueron testigos el 4-XII-77 de la acción predatora de un Halcón en las salinas de San Pedro del Pinatar, Murcia. El ave ataca en picados tendidos a una Avoceta, situada en medio de un grupo de 27 Zampullines Cuellinegros, intentando todos escapar buceando. El hecho de tener la Avoceta algunas plumas del dorso levantadas, nos inclina a pensar en que previamente fuese alcanzada en vuelo. Sólo en la octava pasada consigue la rapaz acuchillarla, aprovechando que la presa no se ha zambullido, con lo que queda la Avoceta semi-flotante panza arriba. Tras un intento fallido de llevársela en las garras, logra el Halcón transportar la presa a un dique de separación entre dos estanques.

**HALCON DE ELEONOR** (*Falco eleonora*)

El 23-V-76, en una visita al campanario de Sant Pol de Mar, fue encontrada una rapaz que penetró en una de las naves. De librea negra, larga cola

y unos 40 cms. de talla, se la trasladó al Parque Zoológico de Barcelona para intentar su recuperación. Identificada como hembra de fase oscura de *Falco eleonorae*, murió a pesar de los cuidados dispensados, tras gangrenársele la pata en la que había recibido un disparo. Sin duda, esta herida la hizo refugiarse en el campanario.

No conocemos más citas del Halcón de Eleonor en Cataluña que las de Wallace y Sage (*Ardeola* 13: 163) en la Costa Brava (O. Cabrero).

### ◀ CERNICALO PRIMILLA (*Falco naumanni*)

Interesados por la nota de Cruz Valero referente a la reducción demográfica de algunas especies en Badajoz (*Ardeola* 20: 351), se ofrece el censo de Primillas de Badajoz Ciudad en dos temporadas consecutivas, contabilizando las parejas reproductoras.

	1976	1977
Avenida de Santa Marina ... ..	3	3
Catedral ... ..	3	4
Iglesia de San Agustín ... ..	2	2
Iglesia de San Andrés ... ..	1	1
Carretera de Olivenza ... ..	1	1
Plaza Alta ... ..	1	1
Proximidades del Puente Romano ... ..	—	1
Avenida de Pardaleras ... ..	—	1
	11	14

Una gran competencia entre Palomas domésticas, Grajillas y Primillas, ocurre al intentar construir los nidos en los respiraderos de los edificios, llevando la peor parte las rapaces. En 1977, dos de las parejas que crían en Santa Marina tuvieron que cambiar de emplazamiento, al estar los huecos del año anterior hospedando nidos de *Corvus monedula*.

Esta mínima recuperación es esperanzadora, aunque dudamos que vuelva a establecerse la población que A. Cruz Valero cita a principios de siglo. Pensamos que esta especie empieza a adaptarse a las vegas de regadío del plan Badajoz, motivo que el citado ornitólogo aduce como principal causante de la drástica disminución de Cernicalos Primillas (C. Sanabria, F. de Lope y F. Carbajo).

### ◀ GRULLA (*Grus grus*)

Observado un grupo de siete aves en La Encanyssada, Delta del Ebro, el 7-XI-75 (J. A. de Albert).

**CHOCHA PERDIZ** (*Scolopax rusticola*)

9-XII-77: se cazan dos ejemplares en la sierra de Carija, junto al embalse de Proserpina (Badajoz). Las aves, que se levantaron a 30 m. una de otra, ocupaban una zona de acebuches y tomillos a media ladera (F. Vázquez).

**ARCHIBEBE CLARO** (*Tringa nebularia*)

I. Agüero, constante observador de la avifauna de la ría de Cubas (Santander), informa de la presencia de dos Archibebes Claros el 2-X-77. Es la primera vez que en quince años contempla esta especie, aunque todos los otoños se detienen grupos de Andarrios Grande —el mayor de 18 ejemplares— y pequeños Limícolas, en especial el Correlimos Común.

**ARCHIBEBE FINO** (*Tringa stagnatilis*)

21-XII-76: un ave en la marisma de Isla Cristina, Huelva, comiendo en un caño sobre el fango que la bajamar deja al descubierto (J. Cabot y P. Jordano).

**CORRELIMOS CANELO** (*Tryngites subruficollis*)

Observación de un ejemplar solitario, el 3-IX-77, en la desembocadura del río Guadalhorce, Málaga (E. Alba).

**CORRELIMOS OSCURO** (*Calidris maritima*)

Dos Correlimos Oscuros estacionan en la playa de La Caleta, Cádiz, del 27-XII-77 al 4-I-78. Frecuentaron siempre en bajamar las mismas rocas, en compañía de un grupo de Vuelvepiedras (F. Soís).

**GAVIOTA ARGENTEA** (*Larus argentatus*)

Enric Carrera comunica sus datos de alimentación de *L. a. michahellis* en el litoral catalán.

22-V-77: durante la travesía marina del Estartit a las islas Medas, en compañía de X. Vilagrassa, X. Parellada y J. Giró, dos ejemplares persiguen un *Apus melba* que consiguen apresar con el pico. Posteriormente, con motivo de la disputa entre las dos Gaviotas por devorarlo, el Vencejo Real cae al mar y es engullido por una de ellas.

Al anillar esta colonia insular los pollos vomitan trozos de pescado, gusanos de harina y —en ocasiones— restos de pollos de gallina.

Invierno 1976: en el recinto del Parque Zoológico de Barcelona, una gran

algarabía de Argénteas rodea a un ejemplar adulto que picotea en el suelo una Paloma doméstica, hasta que la mata y devora. Este comportamiento-predador no es raro en las Gaviotas Argénteas que invernan en el zoo, según nos comunica S. Filella.

En el Delta del Ebro, X. Ferrer (1977) observa como ejemplares jóvenes y adultos cazan Fochas en las lagunas y patos en el mar.

### **GAVIOTA DE AUDOUIN** (*Larus audouinii*)

Con motivo de una prospección herpetológica en las islas Pitiusas, A. Salvador nos informa del hallazgo de una colonia de cría de Gaviota de Audouin en la isla Negra Norte, situada al Oeste de Espalmador. Visitada el 6 de julio de 1978, se censaron 40 parejas y 12 pollos recién voladeros, amén de encontrarse cinco cadáveres de pollos crecidos en la plataforma del islote. Como puede comprobarse, la productividad de los reproductores ha sido baja.

En las salinas de Isla Cristina (Huelva), J. Cabot observa dos aves de esta especie el 27-XII-75, sin volver a encontrarlas en días sucesivos.

### **PAGAZA PIQUIRROJA** (*Hydroprogne caspia*)

El 6-X-74 fue cazada un ave en La Encanyssada, Delta del Ebro. Dato precedente, de la misma especie y localidad, es otro ejemplar obtenido el 5-XI-65 (J. A. de Albert).

### **CHARRAN ARTICO** (*Sterna paradisaea*)

27-XII-77: observación de un ejemplar adulto, aún con plumaje estival, en Cádiz (F. Solís).

### **CHARRANCITO** (*Sterna albifrons*)

El 28-XI-77 se vio en Isla Cristina (Huelva) un ejemplar, con el ala defectuosa, atacando en vuelo a un *Calidris alpina*. Abatido por cazadores el 5-I-78, fue entregado al Departamento de Zoología de la Facultad de Ciencias de Córdoba.

Se trata de una hembra del año que presenta las dos primeras remiges del ala derecha seccionadas por la mitad, y la tercera primaria del ala izquierda reducida a dos tercios de su longitud. Sus medidas son: pico, 29,3 mm.; tarso, 18 mm.; ala, 168 mm. (J. Cabot y P. Serrano).

### **CHARRAN REAL** (*Sterna maxima*)

En la marisma de Isla Cristina (Huelva), se localizó el 4-VII-77 un ejemplar de esta especie. El ave mostraba la característica mancha frontal blanca que la diferencia de la Pagaza Piquirroja. Fue identificado como adulto, pues



carecía de la franja oscura caudal que presentan los jóvenes, de las franjas alares oscuras en la parte superior de las secundarias y supracobertoras —que caracterizan a jóvenes y subadultos—, y, por ser relativamente pequeña la mancha oscura de las primarias.

Este Charrán Real se desplazaba a una altura de 8-10 mts., siguiendo lentamente el cauce del estero de Cuatro Aguas, en actitud de pesca cara al viento. Por tres veces repitió el trayecto, tras volver al punto de partida sobrevolando estanques y salinas.

Otro ejemplar se localizó en este paraje el 24-IX-77 (José y Juan Miguel Cabot).

### **AUTILLO** (*Otus scops*)

Escuchado el canto de un ave, de madrugada, el 22-XI-76 en un jardín del centro de Sevilla. Podía tratarse de un migrante tardío, al no detectarlo en fechas anteriores ni posteriores (F. Fernández Parreño).

### **MOCHUELO** (*Athene noctua*)

Al examinar el contenido estomacal de un ave, se ha encontrado un tritón ibérico (*Triturus boscai*), tres tijeretas (*Forficula auricularia*) y un pequeño Coleóptero. La presencia de Anfibios Urodelos es evento rarísimo en la dieta de las Estrígidas, que difícilmente apresan estos animales de hábitos acuáticos.

El Mochuelo fue encontrado atropellado en término del Barco de Avila, a 1.100 metros en la vertiente Norte de Gredos, el 22-VI-77. Se trata de una zona de huertas y vegetación ribereña, donde existen charcas con abundancia de *Triturus boscai* y *Triturus marmoratus* (J. Melendro y J. Gisbert).

### **LECHUZA CAMPESTRE** (*Asio flammeus*)

El 19-III-76, en el Salobrar de Campos (Mallorca), se encontró un nido de esta especie en medio de un cañizal seco, rodeado de charcas y bien surtido en troncos viejos. Albergaba dos pollos crecidos, encontrándose el cuenco sobre un tronco a 50 cm. del nivel del agua. Los adultos, tras escapar en vuelo rasante, se posaban a unos 200 metros, abundando las egagrópilas en un carrizal seco con matas grandes de saliconia (J. M. Llorens).

### **VENCEJO COMUN** (*Apus apus*)

Se registra la observación tardía de un ejemplar, en vuelo sobre la plaza de Cascorro (Madrid), el 12-XI-77 (F. J. Rueda).

### **VENCEJO REAL** (*Apus melba*)

P. Mestre Raventós llama la atención sobre la cría de este Apodiforme en edificios de Cataluña. El conjunto de sus observaciones abarca: 26-VI-06.—

Sant Miquel del Fai. Aparte la colonia que ocupa los riscos cercanos al santuario, una pareja tiene el nido en un orificio que se forma entre el tejado y una columna. Vuelto a controlar el 26-V-68, continúan las aves criando.

23-V-68.—Varios Cencejos Reales evolucionan por encima de Sabadell, en especial cerca de la iglesia. Tres días después vuelven a verse las aves, sin que la premura de tiempo permita confirmar la nidificación.

12-VI-77. Anotados Vencejos Reales en Terrasa, zona de las Ramblas. La tarde del 18 de junio de este mismo año, dedicada a prospectar varias poblaciones del Vallés occidental, da resultado positivo para esta especie. En Sabadell, se localizan dos parejas entrando a agujeros de las azoteas en el paseo General Primo de Rivera; controladas más de una hora, las aves entran como si cebasen la pollada. Desde este punto, a veces, se observaban grupos de 5-6 aves persiguiéndose, y se vieron más Vencejos Reales en otras zonas de la ciudad. También se localizaron algunos individuos en Santa María de Barberá y Ripollet.

Como los lugares con peñas y riscos quedan muy alejados de estos núcleos urbanos, es de suponer que los Vencejos Reales detectados construyen sus nidos en edificios.

## VENCEJO CAFRE (*Apus caffer*)

26-X-75, Hornachuelos (Córdoba). Se examinan dos pollos totalmente emplumados, encontrados bajo un puente en nido de Golondrina Dáurica. De la boca del nido asomaban plumas y en su interior se hallaban plumas de Paloma y Perdiz, sobre una capa más gruesa de gramíneas.

Visitados otros cuatro puentes, se localizaron otros seis nidos abandonados de *Hirundo daurica*, uno con cama idéntica a la descrita, por lo que podía haber sido ocupado por el Vencejo Cafre. Los cinco nidos restantes presentan un forro de musgo que moldea la cámara interna.

18-I-75, Almería. Se observa un ejemplar en vuelo sobre una construcción militar, viéndolo posteriormente todo el mes. A lo largo de febrero se repiten seis observaciones de una pareja en el mismo sitio mientras que, en marzo, salen diariamente al amanecer y se recogen al atardecer. Solo una pareja de *Delichon urbica* compartía el edificio.

La presencia en estas localidades pone de manifiesto la expansión del Vencejo Cafre hacia el Norte y Este (F. Fernández Parreño, F. Hiraldo y M. Yufera).

## CALANDRIA (*Melanocorypha calandra*)

Se localiza un pequeño grupo de aves de esta especie, el 17 y 30-IV-77, en los llanos de cereal entre Castelló de Farfana y Algerri (Lérida). La conducta agitada de un ejemplar parecía indicar la presencia de nido, en un erial colindante a campos de cultivo (P. Mestre Raventós).

## GOLONDRINA (*Hirundo rustica*)

20-XII-77, Mérida: dos ejemplares que cazan toda la tarde sobre una nave almacén de mazorcas de maíz (F. Vázquez).

**PAJARO MOSCON** (*Remiz pendulinus*)

El verano de 1976 se visita una colonia, compuesta de una docena de nidos, en la margen derecha del Pisuega, término de Cabezón (Valladolid), tras amable información verbal de D. Carlos Llandres. Los nidos penden de ramas exteriores de *Salix* sp., con algunos sobre *Fraxinus* sp. La altura sobre el suelo oscila entre 3,5-4 m. y la distancia mínima entre nidos es de veinte metros.

La visita realizada en 1977, en fecha temprana, no ha permitido censar el núcleo con exactitud, puesto que varios nidos empezaban a construirse. Aun así, la impresión obtenida es de menor demografía que el año precedente.

5-III-76: Captura con red de cuatro ejemplares en librea nupcial. Lugar: vega del río Ortigas a su paso por el cortijo Reyes Huertas, La Guarda (Badajoz). No se pudo comprobar su presencia posteriormente, si bien la zona presenta condiciones favorables al asentamiento y cría. Los comunicantes (L. F. Basanta y P. Pereira, Grupo Accipiter) piensan que se trata de Pájaros Moscones en dispersión invernal.

Como dato demostrativo de la entrada de migrantes a nuestro país, en un conteo de aves en migración posnupcial efectuado por F. J. Purroy en términos de Olaberri (Navarra), el 2-XI-74, se contabilizaron dos *Remiz pendulinus* entre un conjunto de 5.388 ejemplares censados, la mayoría Palomas Torcaces. La zona vigilada para pájaro pequeño fue un collado de 400 metros de longitud, desde el amanecer a las 11 horas, momento en que cesó el movimiento migratorio.

**PINZON REAL** (*Fringilla montifringilla*)

J. Domínguez Conde comunica algunos datos sobre esta especie en las Gándaras de Budiño. 28-XII-77: una pareja, posada en aliso, con un grupo de Pinzón Común. 5-I-78 y 19-III-78: sendas observaciones de un macho solitario.

**ESCRIBANO NIVAL** (*Plectrophenax nivalis*)

El 10-X-76, cerca del cabo Estay (ría de Vigo), fue capturada una pareja de Escribanos Nivales —macho y hembra— por el cazador D. Eliseo Sobrino, que conserva naturalizado al primero. Se trata de un ejemplar que luce librea invernal completa (F. Bárcena).

**ASTRILDA COLIRROJA** (*Estrilda rhodopyga*)

Cinco aves de esta especie fueron observadas en un cauce fluvial cercano a Fuengirola, Málaga, el 8-IV-77. Puede ser el inicio del establecimiento silvestre de pájaros escapados de jaula (P. J. Andrews).

**CASCANUECES** (*Nucifraga caryocatactes*)

Se ha capturado un ejemplar en Vallbona de les Monges (Lérida), el 30-X-77. La zona presenta suaves colinas pobladas por *Pinus halepensis*, con cultivos abancalados de olivo, almendro y cereal. Notificada la captura por D. Alberto Pascual, hemos examinado este Cascanueces y lo clasificamos como pertenecientes a la raza europea —subespecie *caryocatactes*— (P. Mestre).