

NOTICIARIO ORNITOLOGICO

COLIMBO GRANDE (*Gavia immer*)

Parece habitual la presencia en invierno de esta especie en la Bahía de Cádiz pero, normalmente, en muy bajo número: uno o dos ejemplares. Sin embargo el día 29.I.83, coincidiendo con fuertes vientos de Levante en el área, se llegan a observar hasta cinco a un tiempo (L. A. Merino y F. J. Ruiz Martínez).

FULMAR (*Fulmarus glacialis*)

El 27.IV.83 fue hallado un cadáver bastante reciente de Fulmar, de fase clara, en la ría de Vigo (playa de Godeira, Cangas, Pontevedra) (J. A. Pastoriza).

Primera cita de Fulmar para las Islas Canarias. A finales de marzo de 1983 se encontró el cadáver de un ejemplar de fase clara en la pequeña isla de La Graciosa, situada inmediatamente al norte de Lanzarote. Apareció a poca distancia del mar, en la costa este de la isla. Se tomaron las siguientes medidas: longitud del pico, 38 mm.; longitud del ala, 325 mm.; longitud del tarso, 54 mm. Sólo se conoce otra observación de Fulmar en la Región Macaronésica, referente a Madeira (en BANNERMAN, D. A., *Ibis*, 10 (1914): 438-494), pero, de acuerdo con los pescadores de La Graciosa, esta especie se dejaría ver ocasionalmente en las aguas próximas a la isla.

AURELIO MARTÍN H.

PETREL DE BULWER (*Bulweria bulwerii*)

El 1.VI.83 se recoge un ejemplar en el puerto de Vigo, en el interior de una feria de muestras. Curado de pequeñas heridas y tras hacerle algunas fotografías, es puesto en libertad al día siguiente (E. Fernández de la Cigoña y E. Serrano). En Torremolinos (Málaga) un ejemplar fue observado mientras volaba a una distancia mínima de 500 m. de la playa, en fecha 7.II.82 (Andrew Paterson).

PAÍÑO COMUN (*Hydrobates pelagicus*)

Reproducción del Paíño Común en las costas cantábricas. En un islote costero asturiano (La Franca) se han conseguido pruebas de la nidificación de esta especie durante los meses de junio y julio de 1982 y 1983. En 1983 se encontró un huevo frío a la entrada de un hueco en las rocas, y en 1983, dos huevos rotos o eclosionados en el interior de sendas huras. Tanto en este islote como en la llamada isla Conejera (Miengo, Cantabria), han aparecido cadáveres, restos de aves devoradas y cierta cantidad de egagrópilas de Gaviota Argéntea (*Larus argentatus*) conteniendo restos de Paíños, todo lo cual parece atestiguar una fuerte depredación sobre éstos por parte de las Gaviotas, que tienen colonias de cría en ambos islotes.

ISIDORO FOMBELLIDA

PAÍÑO DE LEACH (*Oceanodroma leucorhoa*)

El invierno de 1981-1982, que se caracterizó por fuertes temporales en el mar, produjo una abundancia inusual de Paíños de Leach en nuestras costas (ver *Ardeola*, 29: 177). Nuevos datos aporta la campaña Inspección Costera de Aves Petroleadas, promovida por la Coordinadora para la

Defensa de las Aves: se recogieron en las playas 77 cadáveres de esta especie de Paíño (por sólo cuatro de *Hydrobates pelagicus*), la mayor parte (66) durante el mes de enero. De aquéllos, 55 aparecieron en Galicia, 8 en las costas atlánticas de Andalucía y 10 en las mediterráneas de la región del Estrecho (A. Bermejo, E. de Juana, J. Varela). Un ave fue capturada, el 8.III.82 en Cazalla de la Sierra (Sevilla) a algo más de 100 Kms. en línea recta del mar (M. C. Pérez Gómez).

En noviembre de 1982 fuertes temporales de Poniente llevaron de nuevo numerosos Paíños de Leach a las costas de Cádiz. Los días 7, 8 y 9 pudieron observarse en el mar en número superior al centenar, al tiempo que sobre las playas aparecían bastantes aves muertas (L. A. Merino y F. J. Ruiz).

RABIHORCADO (*Fregata* sp.)

El día 22.V.83, mientras navegaba en su yate frente a las costas de Galicia (unos 25 Km. mar afuera, a la altura de La Coruña), Mr. F. Ripley observó un ave que inmediatamente pudo reconocer como rabihorcado o fragata. Siendo marino retirado, con cierto interés en la identificación de aves y habiendo tenido oportunidad de familiarizarse ampliamente en las Antillas con la especie *Fregata magnificens*, no tuvo duda alguna frente a este ejemplar, cuyos caracteres distintivos pudo apreciar muy bien mientras sobrevolaba la embarcación: tamaño enorme, plumaje negro, alas largas y cola larga y muy profundamente, ahorquillada. No resulta sin embargo posible la determinación específica, dado que son cuatro las especies del género, todas muy parecidas, que podrían aparecer como divagantes en el Atlántico Norte (Cramp, S., y K. E. L. Simmons, 1977: *The Birds of the Western Palearctic*, vol. 1). (Comunicado por S. C. Madge.)

MARTINETE (*Nycticorax nycticorax*)

En la colonia de garzas del Embalse de Bornos, provincia de Cádiz (ver *Ardeola*, 22: 103), se vuelve a constatar la reproducción del Martinete durante la primavera de 1982, con un mínimo de seis parejas. Especies acompañantes son la Garcilla Bueyera (*Bubulcus ibis*) y la Garza Imperial (*Ardea purpurea*). (M. Gil y V. Guimerá.)

GARCILLA CANGREJERA (*Ardeola ralloides*)

En la cola del Embalse del Ebro, cerca de Reñosa (Cantabria) fue observado un ejemplar adulto en fecha 15.IX.79 (I. Fombellida).

GARCETA COMUN (*Egretta garzetta*)

Otro ejemplar melánico de Garceta Común en las Marismas del Guadalquivir. Una garceta de color totalmente negro pizarra, a excepción de la garganta y las bases de dos rémiges primarias en el ala izquierda, que eran blancas, había sido vista en el Lucio de los Ansares (días 27.IV.80 y 7.VI.80), y más tarde (28.IV.81), en las Salinas de Monte Algaida, Santlúcar de Barrameda, a 6,5 Km. del punto anterior. Posteriormente llegaron noticias de que un cazador había abatido una garceta oscura en esas mismas salinas. Examinada, resultó ser el ave de las observaciones anteriores. Sus medidas (pico de 95,1 mm. y tarso de 116,8 mm.) entran dentro del rango ofrecido por Bernis y por Hiraldo (*Ardeola*, 15, 1969: 103-107 y 107-110) para la especie *Egretta garzetta*, mientras que se apartan notablemente del que exhibe *E. gularis*.

CIGUEÑA NEGRA (*Ciconia nigra*)

Un ave el 6.IV.82 en la laguna de Fuente de Piedra (Málaga), y otra el 21.IX.82 sobre el cerro de San Antón, dentro de la ciudad de Málaga (P. Díaz Robledo y M. Garrido). El 14.V.83 un individuo pasa en vuelo bajo sobre el río Grande a su paso por Cártama (Málaga) (E. Alba, J. Crespo y M. Garrido). El 22.V.83 se observa (a las 9,30 h.) un ave en la ría de Tina Mayor (desembocadura del Deva, Cantabria), que se remonta acosada por Cornejas y vuela hacia el este, y más tarde (17 h.) otra, tal vez la misma, a orillas del Embalse del Ebro en Cabañas de Virtus (Burgos), localidad distante 66 Km. de la primera (J. J. Aja, I. Fombellida, J. A. González Morales).

ESPATULA (*Platalea leucorodia*)

El 5.IX.78 se observa un ejemplar adulto mientras se alimenta en el Embalse del Zújar, provincia de Badajoz (A. Aguilar).

PATO MANDARIN (*Aix galericulata*)

Un ejemplar fue cobrado en fecha 8.I.81 en la Rivera del Huéznar, Cazalla de la Sierra (Sevilla) (M. C. Pérez Gómez). Durante los días 12, 13 y 14.IV.82 se efectuaron observaciones sobre un macho adulto que acompañaba a un grupo de cuatro Anades Reales (*Anas platyrhynchos*), en el río Ara cerca de su desembocadura en Ainsa (Huesca) (R. Antor).

PATO CUCHARA (*Anas clypeata*)

Nidificación del Pato Cuchara en la provincia de Zamora. El 16.VII.80 se anilla un pollo casi totalmente crecido en la laguna de Salina Grande, Villafáfila (Zamora). En su compañía se avista otro ejemplar de edad muy parecida, muy probablemente de la misma pollada, pero no resulta posible detectar adultos en los alrededores. La presente parece ser la primera reproducción comprobada de la especie en la mitad norte de España.

LUIS COSTA

CERCETA PARDILLA (*Anas angustirostris*)

El 21.VIII.81, en la antigua marisma de Henares (Jerez de la Frontera, Cádiz), se pudo ver un ejemplar en vuelo dentro de un bando de Anades Reales (J. Ceballos, F. Lebrero y M. Gil).

PORRÓN MOÑUDO (*Aythya fuligula*)

Hembra de Porrón Moñudo incuba en nido de Anade Friso. El día 15.VII.79 se descubrió una hembra de Porrón Moñudo echada en nido situado sobre una pequeña isla del Embalse del Ebro, cerca de Requejo (Cantabria). Cuando tras varios minutos de observación se la hizo volar y se examinó el nido, éste resultó ser propio de Anade Friso (*Anas strepera*), por el tamaño (23-24 cm. de diámetro), el tipo de plumón que lo revestía y el aspecto y tamaño de los huevos (en número de nueve). De hecho, en el tiempo de la observación se pudo ver una hembra de Anade Friso posada en una de las orillas de la isleta y más adelante, en una nueva visita dispensada el 21.VII, se pudo ver el nido en cuestión ocupado por otra o la misma hembra de Friso, que incubaba.

ISIDORO FOMBELLIDA

PORRON BASTARDO (*Aythya marila*)

Un macho en plumaje nupcial fue observado el 6.VI.81 nadando entre otras especies de Anátidas en el Embalse del Ebro (Cantabria) (I. Fombellida).

EIDER (*Somateria mollissima*)

El día 6.III.83 fue observado un macho inmaduro junto a las Islas Cíes, en la Ría de Vigo. Se pudo fotografiar a corta distancia. Posteriormente, el 1.IV.83 varias personas más pudieron observarlo durante la excursión efectuada a dichas islas con motivo de las VII Jornadas Ornitológicas Españolas (E. Fernández de la Cigüeña).

MALVASIA (*Oxyura leucocephala*)

Durante los días 10 y 12.VI.82 se llegaron a observar hasta tres parejas de esta especie en la laguna Salada de Zorrilla (provincia de Cádiz) (M. Barcell, F. Lebrero).

ELANIO AZUL (*Elanus caeruleus*)

En Cazalla de la Sierra (Sevilla) fue muerto un ejemplar en octubre de 1981, en paraje de dehesas con algunas huertas (M. C. Pérez Gómez).

BUITRE NEGRO (*Aegypius monachus*)

Un ave inmadura aquerenciada a cierta colonia de Buitre Común (*Gyps fulvus*) de la provincia de Sevilla. En tres visitas (11.X.81, 26.II.82 y 11.XI.82) se observa en ella costumbre de posarse sobre las rocas en compañía de los Buitres Comunes, desdeñando al parecer los árboles próximos (M. C. Pérez Gómez). También en colonia de Buitre Común se observan tres ejemplares de Buitre Negro, volando junto a individuos de la primera especie, sobre el río Duratón (provincia de Segovia), en fecha 22.I.83 (C. Urdiales, C. Martín de Velasco, J. Sanz Zuasti).

RATONERO COMUN (*Buteo buteo*)

Ratonero comiendo los pollos de un nido de Cigüeña. El día 26.V.83 se observó un Ratonero posado sobre un nido de Cigüeña Blanca (*Ciconia ciconia*), situado en árbol en Villavieja de Lozoya (Madrid). En nido se encontraron dos pollos de Cigüeña muertos y parcialmente devorados. No había adultos de esta especie en las proximidades, por lo que cabe suponer que el nido se encontrara ya abandonado y los pollos muertos cuando el Ratonero bajó a comer de los mismos.

E. LÁZARO, P. CHOZAS y B. ASENSIO

RATONERO CALZADO (*Buteo lagopus*)

Coincidiendo con una intensa ola de frío se efectuó observación de un ejemplar, el 13.II.83, en el término de Tordesillas (Valladolid). El ave se cernía a poca altura sobre un rastrojo, muy cerca de la carretera, y pudo ser observado desde escasos metros (C. Urdiales).

AGUILA PERDICERA (*Hieraeetus fasciatus*)

Nuevo caso de nidificación en árbol. En la provincia de Málaga, el 1.V.80, se encontró un nido situado sobre alcornoque (*Quercus suber*) a una altura de 8 m. Sus dimensiones aproximadas eran 1,3 m. de diámetro por 2,5 m. de altura, y contenía un pollo medio emplumado.

E. ALBA y F. GUERRERO

POLLUELA BASTARDA (*Porzana parva*)

Se observaron dos ejemplares en marzo de 1983 en la Laguna del Remolar, Prat del Llobregat (Barcelona), y uno de ellos pudo ser capturado y anillado el día 6 (G. Chacón Cabas).

FOCHA CORNUDA (*Fulica cristata*)

En la Laguna de Medina (Jerez de la Frontera, Cádiz), el día 7.IX.80 se encontró un ejemplar de esta especie, al parecer afectado de botulismo. Tras darle alimento y agua se recuperó bien (Asociación Jerezana Ecologista).

ANDARRIOS DEL TEREK (*Xenus cinereus*)

En fecha 19.IX.82 un ejemplar de esta especie pudo ser perfectamente observado y fotografiado en una pequeña laguna del Delta del Ebro (Tarragona) (Denis Odier).

ANDARRIOS CHICO (*Actitis hypoleucos*)

Dato de reproducción del Andarrios Chico en la provincia de Málaga. En el río Grande, cerca de Coín (Málaga) hubo ocasión de capturar, anillar y fotografiar un pollo de Andarrios Chico. Antes se le había visto en compañía de dos adultos. La identificación resultó inequívoca, toda vez que el pollo, si bien colicorto y con restos de plumón en cola, dorso y nuca, se encontraba bien emplumado. En el lugar de la observación el río aparecía muy transformado por extracciones masivas de grava, habiendo quedado el cauce ancho, poco profundo y casi desprovisto de vegetación. Es lugar habitual de cría del Chorlito Chico (*Charadrius dubius*). Esta nueva localidad de cría parece ser la más meridional descrita hasta el momento en la Península Ibérica, y en ella sorprenden tanto la baja altitud (apenas 200 m. s.n.m.), como el clima mediterráneo muy cálido.

EDUARDO ALBA y JESÚS CRESPO

FALAROPO PICOFINO (*Phalaropus lobatus*)

El 16.V.77, en las cercanías de Santa Amalia (Badajoz), fueron observados tres ejemplares mientras nadaban y picoteaban en unos aguazales. Con ellos se movían otros diversos limicolos, entre los que sobresalían por su rareza un ejemplar de Vuelvepedras (*Arenaria interpres*) y cuatro de Correlimos Tridáctilo (*Calidris alba*). Esta curiosa concentración, ciertamente inusual en el interior de la Península, coincidió con fuertes temporales de Poniente en el Atlántico (A. Aguilar).

FALAROPO PICOGRUESO (*Phalaropus fulicarius*)

Con ocasión de la Inspección Costera de Aves Petroleadas de 1982 (Coordinadora para la Defensa de las Aves), fueron recogidos sobre las playas un cadáver de esta especie en Galicia y dos en Cádiz. Estos últimos fueron encontrados el 30.I.82 por J. Alonso y O. del Junco entre Tarifa y Barbate (A. Bermejo, E. de Juana y J. Varela).

PAGALO PARASITO (*Stercorarius parasiticus*)

Un ejemplar inmaduro fue abatido en las cercanías de Ainsa (Huesca) el 15.X.82 (R. Antor y P. L. Escartín).

GAVIOTA ENANA (*Larus minutus*)

Se observó un adulto en plumaje invernal, el 31.III.79, en un dormitorio de Gaviotas Reidoras emplazado en una gravera inundada, cerca de Arganda (Madrid) (L. Gómez Domínguez).

PAGAZA PIQUIRROJA (*Hydroprogne caspia*)

Un individuo junto a gaviotas, en playa cerca de la desembocadura del río Guadalhorce (Málaga), el 3.X.82 (E. Alba).

CHARRAN REAL (*Sterna maxima*)

Se observó un ave desde la playa, cerca de Torremolinos (Málaga), en fecha 14.VII.83 (A. Paterson). El mismo observador comunica otro ejemplar visto en la Bahía de Algeciras el 19.IX.81.

FUMAREL ALIBLANCO (*Chlidonias leucopterus*)

El 19.VII.82 se observó un ejemplar volando al atardecer en la cabecera del Embalse de Cazalegas (Toledo) (F. Ojeda).

MERGULO MARINO (*Plautus alle*)

Datos diversos referentes a su presencia invernal en las costas cantábricas: un cadáver en la playa de Berría (Santoña) el 25.II.79; sendos cadáveres en la playa de Valdearenas (Lienres) en fechas 11.III.79 y 1.XII.79; un ejemplar observado en vuelo raso sobre las aguas de la marisma de Santoña, que termina posándose entre ánades, el 16.XII.79 (I. Fombellida).

Además se encontraron dos ejemplares muertos en las playas durante la Inspección Costera de Aves Petroleadas de 1982, uno en el País Vasco (mes de febrero) y uno en la provincia de Cádiz (encontrado por J. Alonso y O. del Junco el 30.I.82, entre Tarifa y Barbate) (A. Bermejo, E. de Juana y J. Varela).

VENCEJO COMUN (*Apus apus*)

Más datos sobre cría del Vencejo Común en árboles. Dentro de Badajoz capital se han podido encontrar al menos 36 parejas de esta especie criando en palmeras de parques y jardines, en el modo señalado por Herrera y Ramírez para la ciudad de Sevilla (*Ardeola*, 22: 146). La colonia más nutrida se situaba en la plaza de San Francisco, con un mínimo de 31 nidos, pero también aparecieron nidos en otros tres lugares (respectivamente, dos, dos y un nidos). Estos se situaban sobre palmeras de las especies *Phoenix canariensis* y *Ph. dactylifera*, resultando claramente preferida la primera, de estípote más grueso y que deja más huecos (en los puntos señalados aparecieron ocupadas al menos 23 *Ph. canariensis* por sólo dos *Ph. dactylifera*, sobre un total disponible de 60 y 40 palmeras de cada tipo). El número máximo de nidos por palmera fue de cuatro. Las alturas de los nidos sobre el suelo oscilaron entre los 4 y los 15 m. En la colonia principal se vio cómo los Vencejos competían por la ocupación de huecos con Gorriónes Comunes (*Passer domesticus*), quienes a veces les hacían objeto de persecuciones en vuelo.

J. J. FERRERO, J. J. NEGRO, J. A. ROMÁN,
M. CABRERO, A. GUTIÉRREZ y V. M. PIZARRO

VENCEJO CAFRE (*Apus caffer*)

En Guajar-Faragüit (Granada), se hicieron observaciones sobre esta especie los días 10 (un ave), 11 (dos aves juntas) y 12.VIII.81 (un ave). Estos Vencejos permanecieron todos los días en una misma zona, por lo que se estima que pudieron haber constituido una sola y la misma pareja (Guillem C. Cabas).

TORCECUELLO (*Jynx torquilla*)

Dos datos plenamente invernales para el Valle del Ebro: el 29.XII.81 se encuentra un cadáver reciente junto al Embalse de Las Cañas (Viana, Navarra), mientras que el 1.I.82 se observa un ejemplar en sotos del río Ebro junto a la ciudad de Logroño (L. Lopo). Más al sur, un ave fue registrada a orillas del Guadiana, entre las localidades de Valdivia y Entrerriós (provincia de Badajoz), en fecha 4.II.78 (Adolfo Aguilar).

GOLONDRINA COMUN (*Hirundo rustica*)

El 1.I.82, dos Golondrinas Comunes vuelan a ras de agua sobre el río Ebro, cerca de Logroño (L. Lopo).

ALONDRA DE DUPONT (*Chersophilus duponti*)

Dos recientes trabajos (SUÁREZ, F.; SANTOS, T., Y TELLERÍA, J. L., 1982. *Le Gerfaut*, 72: 231-235, y ARAGUES, A., Y HERRANZ, A., 1983. *British Birds*, 76: 57-62), amplían considerablemente lo conocido sobre distribución en Iberia de esta especie, que aunque escasa, parece hallarse bastante repartida por parameras y eriales de buena parte del país. A la hora de detectarla resulta fundamental conocer el peculiar reclamo. Nuevas localidades llegadas a la redacción de *Ardeola* son las siguientes: 1) Cuevas de los Ubedas (Almería), tomillares y espartales al sur de Sierra Alhamilla: una canta en vuelo a fines de mayo de 1978 (L. García y J. M. Miralles) y nuevos cantos se escuchan en 1981 y 1982, en distintas fechas (J. M. Miralles); 2) Guadix (Granada), estepa de albardín en la

carretera a Baza: bando de una veintena observado mientras come en el suelo en fecha 5.VIII.78 (E. de Juana); 3) Villaseca (Segovia), páramos junto a la ermita de San Frutos: un ejemplar observado hacia el 8.VIII.76 (A. Aguilar) y oídos reclamos en tres puntos distintos el 8.III.81 (E. de Juana y F. de Juana); 4) Sepúlveda (Segovia), páramos en el comienzo de la carretera a Castrillo: se oye reclamo de un ave el 8.III.81 (M. Gómez Pajuelo, E. de Juana y F. de Juana); 5) Gallocanta (Zaragoza), eriales inmediatos a la ermita: reclamos de una o dos aves el 14.III.82 (E. de Juana).

TERRERA MARISMEÑA (*Calandrella rufescens*)

Un ejemplar, probablemente en dispersión o en paso, fue observado el 2.VII.77 cerca de Santa Amalia (Badajoz) (A. Aguilar).

BISBITA DE RICHARD (*Anthus novaseelandiae*)

En fecha 17.I.77 se observaron dos ejemplares, posados en el suelo entre varios Bisbitas Comunes (*Anthus pratensis*), en Arroyo Hornillo, Valdehornillos (Badajoz) (A. Aguilar).

BISBITA ARBOREO (*Anthus trivialis*)

La Sierra de Nogueira, cerca de Braganza (Tras os Montes, Portugal) parece quedar dentro del área de reproducción de esta especie. El 23.V.82 fue observado un macho cantando y efectuando los típicos vuelos de celo en un robledal de *Quercus pyrenaica*. Al día siguiente el ave continuaba cantando en el mismo lugar y posteriormente, otro individuo fue localizado con idéntico comportamiento nupcial (B. Heredia).

BISBITA GORGIRROJO (*Anthus cervinus*)

Un grupo de seis aves, muy confiadas, fue visto el 29.VII.81 en las afueras de Badalona (Barcelona) (Guillem C. Cabas).

ALCAUDON DORSIRROJO (*Lanius collurio*)

El 17.IX.77 se observó un macho junto a la desembocadura del río Guadalhorce, en Málaga (E. Alba).

URRACA (*Pica pica*)

La Urraca nidificando en Almería. Desde la provincia de Cádiz hasta por lo menos, la de Almería, se extiende una franja litoral en el extremo sur de España donde, de forma un tanto sorprendente, faltaba la Urraca como especie nidificante. Sin embargo, en Almería se asiste en los últimos años a lo que parece una colonización. En mayo de 1979 se anotaron por primera vez tres ejemplares entre las localidades de Sorbas y Vera. En abril de 1980 se vio un ejemplar por la misma zona. En mayo de 1982, dos aves juntas en las proximidades de Tabernas. Finalmente en 1983, en

esta última localidad, se han conseguido descubrir dos nidos: uno el 6.IV, con huevos, y el otro el 4.V, con pollos emplumados. Se situaban respectivamente en un olivo (*Olea europaea*) y en un almendro (*Prunus amygdalus*).

S. CAÑADAS, H. CASTRO, E. DE JUANA,
J. MANRIQUE y J. M. MIRALLES

TARABILLA NORTEÑA (*Saxicola rubetra*)

Se observó una hembra en la Playa de Palma (isla de Mallorca) en fecha 17.II.82 (D. Muselet).

ALZACOLA (*Cercotrichas galactotes*)

Primera cita para el Archipiélago Canario. Se observó un adulto, el día 14.VI.83, en las proximidades de Jambio, localidad situada en el SW de Lanzarote (M. Ascanio, E. Hernández, A. Martín).

COLIRROJO REAL (*Phoenicurus phoenicurus*)

Se encuentra nido con cuatro pollos en corraliza cercana a Lízara (Aragüés del Puerto, Pirineo de Huesca), en terreno de pastizal con hayas dispersas, a unos 1.500 m. s.n.m. Parecen faltar datos concretos sobre la cría de esta especie en Aragón (de acuerdo con ARAGUES, A., y J. LUCIENTES, 1980: *Fauna de Aragón: las Aves*) (J. Orta).

PECHIAZUL (*Cyanosylvia svecica*)

El 26.IV.82 fue observado un macho cantando en un brezal de *Erica arborea*, a 1.550 m.s.n.m., en el alto del Puerto de Leitariegos, límite entre las provincias de Asturias y León. Dadas la fecha y la actitud del ave, así como lo apropiado del biotopo, parece bastante probable la nidificación en esta zona, que por otra parte se sitúa entre las ya conocidas de la Sierra de la Cabrera y los Picos de Europa (B. Heredia).

Se han realizado observaciones plenamente invernales en la desembocadura del río Guadalhorce, Málaga, en tres diferentes años. El 15.XII.79: un macho capturado; del 1 al 7.XII.81: un macho observado y fotografiado; el 25.XI.82: un macho capturado y anillado. En todos los casos fueron machos de la raza *svecica* (medalla roja). Mostraban preferencia por estercoleros (E. Alba).

Otra observación plenamente invernal, más al norte. El 4.I.82 se observa un ejemplar de la forma *cyanecula* (medalla blanca) comiendo sobre montón de estiércol, en Jeresa (Valencia) (I. García Peiró).

TREPARRISCOS (*Tichodroma muraria*)

Nuevas localidades de invernada en el Centro de España. El 6.I.83 se observa un ejemplar en cortados de la zona conocida como Laguniibo, en la Serranía de Cuenca (Alejandro Martínez). El 1.IV.83 se observa otro ave en paredes calizas situadas en el término de Somolinos (Guadalajara) (J. L. Arias).

ESCRIBANO NIVAL (*Plectrophenax nivalis*)

Observación en una localidad muy al interior, a orillas del Embalse de Ricobayo (río Esla), cerca de Montamarta (Zamora). El día 22.II.81 fue bien visto y fotografiado un macho que mostraba conducta muy confiada (A. Gómez Manzaneque, R. Martí, M. Morales y J. A. Perales).